

Spiraea blumei (Tavolník Blumeův)

synonyma: *Spiraea amabilis*, *S. f. amabilis*, *S. var. amabilis*, *S. var. blumei*, *Spiraea hypoglauca*, *Spiraea obtusa* var. *latifolia*, *Spiraea ribisoidea*, *Spiraea rupestris*, *Spiraea sikokualpina* var. *glabra*, *Spiraea trilobata*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Čína, Japonsko, Korea

Roste v Japonsku, Koreji a Číně v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5 - 2m. Kmínky jsou vzpřímené a na bázi vystoupavé. Větve jsou slabé a obloukovitě převislé. Listy jsou vejčité až mírně kosočtvercovité, tupé až prakticky zakulacené nebo téměř špičaté, zastříhovaně vroubkovaně pilovité, dlouhé 2 - 4cm, spodní strana modře zelená, bohatě žilkovaná a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Květenstvím je 10 - 25tkvětý okolík, listeny jsou dlouhé 1 - 3mm, vlastní květy mají průměr 5 - 8mm, kališní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm, korunní lístky jsou bílé, široce obvejčité a dlouhé 2 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *blumei* - listy kosočtvercovitě vejčité až obvejčité, dlouhé 2 - 3,5cm; květy i stopky holé, korunní lístky průměru 2 - 3,5mm
- var. *latipetala* - listy kosočtvercovitě vejčité, dlouhé do 3,5cm; kalich a stopky drobně ochlupené, korunní lístky průměru 4 - 5mm
- var. *microphylla* - Čína; listy široce vejčité, dlouhé 6 - 9mm; kalich i stopky holé
- var. *pubicarpa* - Čína; semeníky a plody ochlupené

<https://www.rostliny.net/>