

Lindera glauca

synonyma: Benzoin glaucum, Benzoin glaucum var. kawakamii, L. f. glabella, L. var. kawakamii, L. var. parvifolia

čeleď: Lauraceae

oblasti: Japonsko, Korea, Myanmar (Barma), Tchaj-wan, Vietnam

Roste v Číně, Koreji, Vietnamu, Japonsku, Myanmaru a Tchaj-wanu v podobě opadavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 8m. Borka je hladká, šedá až šedě bílá. Větve jsou v mládí žlutě bílé a ochlupené. Listy jsou obvejčité až vejčité, zelené, na podzim růžově fialové, oranžové a červené, dlouhé 4 - 9cm, široké 2 - 6cm, spodní strana je ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4mm. Květenstvím je úžlabní okolík, zákrovní listeny jsou zelené, samčí květy mají 1,2 - 1,5cm stopku, korunní lístky jsou eliptické, žluté, dlouhé 2,2mm, samičí květy mají 3 - 6mm stopku, korunní lístky žluté, eliptické až obvejčité a dlouhé 2mm. Plodem je kulatá černá peckovice šířky 6 - 7mm na 1 - 1,5cm stopce.

<https://www.rostliny.net/>