

Lindera nacusua

synonyma: Benzoin bifarium, Benzoin nacusua, Benzoin nacusuum, Daphnidium bifarium, Laurus nacusua, Lindera bifaria

čeleď: Lauraceae

oblasti: Bhútán, Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Vietnamu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 15m při průměru kmene 10 - 15cm. Borka je šedá, podélně popraskaná. Větve jsou v mládí hnědé a ochlupené. Listy jsou střídavé, široce vejčité až úzce eliptické nebo kopinaté, špičaté, lesklé, kožovité, oboustranně ochlupené, dlouhé 6 - 15cm, široké 2 - 7,5cm, báze špičatá nebo klínovitá (i zakulacená), žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství tvoří 1 - 4 úžlabní okolíky na 2 - 3mm stopce, samčí jsou 8míkvěté, vlastní květy žluté na 4 - 5,5mm stopce, mají 6 vejčitých ochlupených lístků délky 3,5mm, šířky 2mm, samičí jsou 2 - 6míkvěté, vlastní květy žluté na 3 - 5mm stopce, mají 6 široce vejčitých korunních lístků délky 2mm a šířky 1,5mm. Plodem je prakticky kulaté červené peckovice průměru 6mm na 5 - 7mm stopce. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. menglungensis - Yunnan; listy elipticky kopinaté až kopinaté, mírně řídce ochlupené
- var. nacusua/Benzoin bifarium/Benzoin nacusuum/Daphnidium bifarium/Laurus nacusua/L.bifaria/L. communis var. grandifolia/L. duclouxii/L. nacusua var. sutchuanensis - Čína, Bhútán, Indie, Myanmar, Nepál a Vietnam; listy eliptické, podlouhlé nebo vejčité a ochlupené

<https://www.rostliny.net/>