

Chionanthus (Bělas)

čeleď: Oleaceae

Roste v mírném pásu Severní Ameriky a Číny v podobě opadavého nebo stálezeleného keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky 3 - 25m. Listy jsou vstřícné, řapíkaté a celokrajné. Květenství se může objevit až po 10ti letech, květenstvím je úžlabní nebo vrcholová lata, hlávka nebo latnatý vrcholík, vlastní květy mohou být jednopohlavné nebo oboupohlavné, kalich malý, 4zubý až 4laločný, koruna bílá nebo žlutá s krátkou trubkou a prakticky k bázi rozeklanými laloky. Plodem je peckovice obsahující zpravidla 1 semeno. Nejznámějším druhem je Ch. virginicus.

Vyhovuje jim plné slunce, chráněné místo a dobře propustná vlhká půda bohatá na živiny.

Množí se semeny.

Chionanthus abriaquiensis

Chionanthus acuminatissimus

synonyma: Linociera acuminatissima

Chionanthus acunae

synonyma: Linociera acunae

Chionanthus adamsii

Chionanthus albidiflorus

synonyma: C. axillaris var. prostratus, C. axillaris var. rostrata, C. leprocarpus, C. malabaricus var. albidiflorus, C. rostratus, C. zeylanicus var. rostratus, Linociera albidiflora, Linociera albidiflora var. rostrata, Linociera leprocarpa, Linociera rostrata, Mayepea leprocarpa, Mayepea rostrata

oblasti: Srí Lanka, Střední Asie

Pochází ze Srí Lanky.

Chionanthus ambliirrhinus

Chionanthus avilensis

synonyma: Linociera avilensis

Chionanthus axillaris

synonyma: C. acuminigerus, Linociera acuminigera, Linociera axillaris, Mayepea axillaris

oblasti: Queensland

Pochází z Queenslandu, Austrálie.

Chionanthus axilliflorus

synonyma: *Linociera axilliflora*, *Mayepea axilliflora*

oblasti: Portoriko

Pochází z Karibiku.

Chionanthus bakeri

synonyma: *Linociera bakeri*

Chionanthus balgooyanus

Chionanthus beccarii

synonyma: *Linociera beccarii*

Chionanthus brachystachys

synonyma: *Linociera brachystachys*, *Notelaea brachystachys*, *Notelaea francii*, *Osmanthus brachystachys*, *Osmanthus francii*, *Sarlina cylindrocarpa*

Chionanthus brachythyrsus

oblasti: Hainan, Vietnam

Roste na Hainanu a ve Vietnamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 12m. Větve jsou v mládí v kolénkách mírně zploštělé. Listy jsou eliptické, tupé, ale krátce ocasovité, dlouhé 3,5 - 20cm, široké 1,5 - 5,5cm, báze je klínovitá až prakticky tupá, žilnatinu tvoří 6 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je vrcholová lata délky 1 - 1,5cm, vlastní květy mají 1,2 - 3cm stopku, kalich laloky délky 1 - 1,5mm, koruna je bílá, dlouhá 5 - 7mm a laloky úzce eliptické až čárkovité. Plodem je mírně vejčitá peckovice délky 1,1cm a šířky 7mm.

Chionanthus brassii

synonyma: *Linociera brassii*

Chionanthus bumelioides

synonyma: *Linociera bumelioides*, *Mayepea bumelioides*

Chionanthus callophyllus

Chionanthus callophyllus

synonyma: *C. platycarpus*, *Linociera callophylla*, *Linociera paludosa*, *Mayepea callophylla*, *Olea platycarpa*

Chionanthus caudatus

oblasti: Myanmar (Barma)

Pochází z Myanmaru.

Chionanthus caudifolius

synonyma: Linociera caudata, Linociera caudifolia

Chionanthus caymanensis

Chionanthus celebicus

Chionanthus chrysopetalus

Chionanthus clementis

synonyma: Linociera clementis

Chionanthus colonchensis

Chionanthus compactus

synonyma: Ceranthus corniculatus, Ceranthus schreberi, C. caribaea, C. gorgonae, Linociera alba, Linociera caribaea, Linociera compacta, Linociera santamartensis, Mayepea caribaea

oblasti: Portoriko

Pochází z Karibiku.

Chionanthus cordulatus

Chionanthus coriaceus

synonyma: Linociera coriacea, Linociera phanerophlebia, Linociera urdanetensis, Linociera vidalii, Mayepea coriacea

Chionanthus courtallensis

synonyma: C. leprocarpus var. courtallensis, Linociera courtallensis, Linociera leprocarpa var. courtallensis

Chionanthus crassifolius

synonyma: Linociera crassifolia, Mayepea crassifolia

Chionanthus crispus

Chionanthus curvicaupus

Chionanthus cuspidatus

synonyma: Linociera cuspidata, Mayepea cuspidata

Chionanthus decipiens

Chionanthus densiflorus

synonyma: Linociera densiflora, Mayepea densiflora

Chionanthus dictyophyllus

synonyma: Linociera dictyophylla

Chionanthus diversifolius

synonyma: Linociera diversifolia, Mayepea diversifolia

Chionanthus domingensis

synonyma: Linociera domingensis, Mayepea domingensis, Mayepea domingensis var. incrassata

oblasti: Portoriko

Pochází z Karibiku.

Chionanthus dussii

synonyma: Linociera dussii, Mayepea dussii

Chionanthus ellipticus

synonyma: Linociera cuspidata, Linociera elliptica, Linociera ridleyi, Mayepea elliptica

Chionanthus enervis

synonyma: Myxopyrum enerve

Chionanthus eriorachis

synonyma: Linociera eriorachis

Chionanthus evenius

synonyma: Linociera evenia

Chionanthus ferrugineus

synonyma: Linociera ferruginea

Chionanthus filiformis

synonyma: Bonamica filiformis, C. mandiocanus, Linociera mandioccana, Mayepea mandioccana

Chionanthus fluminensis

synonyma: Tessarandra fluminensis

Chionanthus foveolatus

oblasti: J Afrika

Pochází v jižní Africe v podobě stálezeleného stromu s bohatě větvenou korunou. Dorůstá výšky 2 - 15 (i 30)m. Borka je šedá a drobně šupinaté. Vrcholové větvičky jsou krátké, pouze se 2ma páry listů. Listy jsou vstřícné, protáhlé, podvinuté, kožovité, lesklé, tmavě zelené, dlouhé 3 - 9cm, široké 1,3 - 3,7cm, báze zúžená až zakulacená, spodní strana světlejší a řapíky krátké. Květenství je úžlabní, vyrůstá na starém dřevě, vlastní květy jsou bílé, béžové nebo narůžovělé, sladce aromatické a dlouhé 5 - 7mm. Plody jsou růžově fialově černé, dužnaté, podlouhlé nebo vejčité a dlouhé 1,5 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. foveolatus - větve v mládí holé; listy eliptické, tupé, na okraji tlusté, dlouhé 5,5 - 9cm, široké 1,5 - 3,5cm, báze zakulacená až srdčitá a řapíky dlouhé 2 - 3mm; plody podlouhlé délky 1,5 - 2cm
- subsp. major - větve v mládí holé; listy podlouhlé až obvejčité, na vrcholu zúžené, dlouhé 4 - 8cm, široké 2 - 3,5cm a řapíky dlouhé 0,5 - 1,5cm; plody dlouhé do 3cm a široké 2cm
- subsp. tomentellus - větve v mládí ochlupené; listy široce eliptické až podlouhlé, špičaté, podvinuté, zpět zahnuté, dlouhé 2 - 6cm, široké 1 - 3cm a řapíky dlouhé 2 - 3mm

Chionanthus gardneriorum

Chionanthus gigas

synonyma: Linociera gigas

Chionanthus globosus

synonyma: C. elaeocarpus var. globosus

Chionanthus glomeratus

synonyma: Linociera blumeana, Mayepea glomerata

Chionanthus grandifolius

synonyma: Linociera grandifolia

Chionanthus greenii

Chionanthus quangxiensis

synonyma: *Linociera quangxiensis*

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 6m. Větve jsou v mládí na kolénkách mírně zploštělé a ochlupené. Listy jsou eliptické (i prakticky kulaté), zašpičatělé (i zakulacené), kožovité, lesklé, dlouhé 5 - 9,5cm, široké 1 - 4,5cm, báze je protáhlá, sbíhavá, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek, řapík je křídlatý a dlouhý 1,2 - 2cm. Květenstvím je úžlabní lata délky 2 - 4cm, vlastní květy mají 0,5 - 2mm stopku, kalich délky 1mm, laloky vejčité 3úhlé, koruna je dlouhá 2 - 2,5mm a laloky podlouhlé. Plodem je ojíněná eliptická peckovice délky 1,2 - 2cm a šířky 0,9 - 1,2cm.

Chionanthus guianensis

synonyma: *C. guianensis*, *C. mayepea*, *C. tetrandrus*, *Linociera tetrandra*, *Mayepea guianensis*, *Peschiera praeclara*, *Tabernaemontana praeclara*

Chionanthus hahlii

synonyma: *Linociera hahlii*

Chionanthus hainanensis

synonyma: *Linociera hainanensis*, *Linociera ramiflora* f. *caudatifolia*

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 12m. Větve jsou v mládí mírně zploštělé. Listy jsou obvejčité až kopinaté nebo eliptické, tupé až krátce ocasovité, mírně kožovité, lesklé, dlouhé 5 - 11cm, široké 1,5 - 4cm, báze je protáhlá, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholová lata délky 2 - 7,5cm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, kalich má 3úhlé cípy, koruna je bílá, dlouhá 2 - 3mm, laloky podlouhlé a na bázi v párech spojené. Plodem je modře černá eliptická peckovice délky 1,3 - 1,5cm a šířky 8 - 9mm.

Chionanthus harmandii

synonyma: *Linociera harmandii*

Chionanthus havilandii

Chionanthus henryae

Chionanthus henryanus

synonyma: *C. helferi*, *C. montanus*, *Linociera henryi*

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 18m. Větve jsou zploštělé a v mládí mírně ochlupené. Listy jsou obkopinaté, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 16 - 33cm, široké 4 - 13cm, báze je protáhlá, sbíhavá, žilnatinu tvoří 11 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 4cm. Květenstvím je úžlabní lata délky 9 - 15cm, vlastní květy jsou prakticky přisedlé, kalich ochlupený, cípy úzce vejčité, dlouhé 1 - 1,5mm, koruna je dlouhá 2 - 3mm a laloky podlouhlé. Plodem je černá úzce vejčitá až úzce eliptická peckovice délky 0,5 - 1cm a šířky 2,5 - 5mm.

Chionanthus holdridgei

oblasti: Portoriko

Pochází z Karibiku.

Chionanthus holdridgii

synonyma: *Linociera holdridgii*

Chionanthus implicatus

synonyma: *C. confertus*, *C. idroboi*, *Mayepea implicata*

Chionanthus intermedius

oblasti: Indie, Střední Asie

Pochází z Indie.

Chionanthus jamaicensis

synonyma: *Linociera jamaicensis*

Chionanthus kajewskii

synonyma: *Linociera kajewskii*

Chionanthus kinabaluensis

Chionanthus kostermansii

Chionanthus lancifolius

synonyma: *Linociera lancifolia*, *Linociera parvifolia*, *Olea ardisioides*

Chionanthus leopoldii

Chionanthus ligustrina

synonyma: Linociera latifolia, Linociera ligustrina, Linociera nigra, Mayepea latifolia, Mayepea ligustrina, Thouinia ligustrina

Chionanthus ligustrinus

oblasti: Portoriko

Pochází z Karibiku.

Chionanthus littoreus

synonyma: Linociera litorea

Chionanthus longiflorus

synonyma: Linociera longiflora

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 10m. Větve mohou být mírně zploštělé. Listy jsou mírně vejčité až eliptické, zašpičatělé, řídce šupinaté, dlouhé 6 - 15cm, široké 3 - 6,5cm, báze je protáhlá, žilnatinu tvoří 8 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3,5cm. Květenstvím je úžlabní bohatá lata, vlastní květy mají 1 - 2cm stopku, kalich délky 1 - 2mm, laloky vejčité, koruna je dlouhá 5 - 8mm, laloky jsou kopinaté a tupé.

Chionanthus longipetalus

synonyma: Linociera longipetala

Chionanthus lucens

Chionanthus luzonicus

synonyma: Linociera luzonica, Mayepea luzonica

Chionanthus macrobotrys

synonyma: Linociera macrobotrys, Linociera scandens

Chionanthus macrocarpus

synonyma: C. elaeocarpus, C. insignis, Linociera elaeocarpa, Linociera insignis, Linociera macrocarpa, Mayepea insignis

Chionanthus macrothyrsus

synonyma: Linociera macrothyrsa

Chionanthus mala-elengi

synonyma: Forsythia mala-elengi, Ligustrum microphylla

Chionanthus maxwellii

Chionanthus megistocarpus

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 10 - 30m při průměru kmene 20 - 50cm. Větve jsou v mládí nažloutlé. Listy jsou vstřícné, obvejčitě kopinaté až eliptické, zpravidla tupé, kožovité, dlouhé 10 - 27cm, široké 4 - 9cm, báze je úzce klínovitá, sbíhavá, žilnatinu tvoří 10 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 3,5cm. Květenstvím je úžlabní lata délky 8 - 20cm, listeny jsou žlutě zelené, záhy opadavé, dlouhé do 1,5cm, vlastní květy jsou oboupohlavné, aromatické, mají 1 - 3mm stopku, kalich pohárkovitý, dlouhý 2mm, široký 2,5mm, se 4mi široce 3úhlými ochlupenými zahnutými laloky délky 0,4 - 0,6mm, koruna je bíle zelená, se 4mi korunními lístky délky 3 - 6mm a šířky 0,3 - 0,4mm. Plodem je prakticky kulatá až eliptická růžově fialová peckovice délky 4,5 - 5cm a šířky 4,2 - 4,7cm.

Chionanthus micranthus

synonyma: Linociera micrantha, Mayepea micrantha

Chionanthus microbotrys

synonyma: Linociera microbotrys

Chionanthus microstigma

synonyma: C. sangda, Linociera microstigma, Linociera sangda

Chionanthus minutiflorus

synonyma: Linociera minutiflora, Mayepea minutiflora

Chionanthus montanus

synonyma: C. monticola, Linociera montana, Mayepea montana, Notelaea lanceolata, Notelaea rostrata

Chionanthus nitens

synonyma: Linociera nitens

Chionanthus nitidus

synonyma: Linociera nitida

Chionanthus oblanceolatus

synonyma: Linociera oblanceolata

Chionanthus oblongifolius

synonyma: Linociera oblongifolia

Chionanthus oliganthus

synonyma: Linociera oligantha

Chionanthus pachyphyllus

synonyma: Linociera pachyphylla

Chionanthus palustris

Chionanthus panamensis

synonyma: Linociera panamensis

Chionanthus parkinsonii

synonyma: C. brachythyrsus, C. calcicola, C. leucocladus, Linociera brachythyrsa, Linociera calcicola, Linociera leucoclada, Linociera parkinsonii

Chionanthus parviflorus

synonyma: C. parviflora

Chionanthus pedunculatus

synonyma: Linociera paniculata, Notelaea paniculata

Chionanthus picrophloia

oblasti: Queensland

Pochází z Queenslandu, Austrálie.

Chionanthus plurifloroides

Chionanthus pluriflorus

synonyma: Linociera pluriflora, Linociera verruculosa

Chionanthus polycephalus

Chionanthus polygamus

synonyma: C. laxiflorus, Linociera laxiflora, Linociera oxycarpa, Linociera polygama, Mayepea laxiflora

Chionanthus porcatus

Chionanthus proctorii

Chionanthus pubescens

synonyma: Linociera pubescens

oblasti: Ekvádor, Peru

Pochází z Peru a Ekvádoru.

Chionanthus pubicalyx

synonyma: Linociera pubicalyx

Chionanthus purpureus

synonyma: Linociera odorata, Linociera purpurea, Mayepea odorata, Mayepea zeylanica, Thouinia nutans

Chionanthus pygmaeus

oblasti: Florida

Pochází z jihovýchodu USA.

Chionanthus pyriformis

Chionanthus quadristamineus

synonyma: Linociera quadristaminea, Mayepea quadristaminea, Notelaea quadristaminea

oblasti: Tichý oceán

Pochází z Norfolského ostrova, Austrálie.

Chionanthus racemosus

synonyma: Linociera racemosa, Mayepea racemosa

Chionanthus ramiflorus

synonyma: C. effusiflorus, C. intermedius, C. macrophyllus, C. macrophyllus var. attenuatus, C. palembanicus, C. paniculatus, C. paniculatus var. roxburghii, C. pauciflorus, C. pauciflorus var. evolutior, C. pauciflorus var. palembanicus, C. picrophloius, C. ramiflorus var. grandiflorus, C. ramiflorus var. palembanicus, C. ramiflorus var. peninsularis, C. ramiflorus var. ramiflorus, C. roxburghii, C. roxburghii var. intermedius, C. tenuiflorus, Linociera cuminginna, Linociera effusiflora,

Linociera intermedia, *Linociera intermedia* var. *roxburghii*, *Linociera macrophylla*, *Linociera macrophylla* var. *attenuata*, *Linociera oblonga*, *Linociera pauciflora*, *Linociera pauciflora* var. *evolutior*, *Linociera pauciflora* var. *palembanica*, *Linociera picrophloia*, *Linociera ramiflora*, *Linociera ramiflora* f. *pubisepala*, *Linociera ramiflora* var. *grandiflora*, *Mayepea cumingiana*, *Mayepea intermedia*, *Mayepea palembanica*, *Mayepea pauciflora*, *Mayepea picrophloia*, *Mayepea ramiflora*, *Olea attenuata*, *Olea floribunda*, *Olea paniculata*, *Olea pauciflora*, *Olea roxburghiana*, *Olea roxburghii*, *Phillyrea ramiflora*

oblasti: Indie, J Čína, Nepál, Queensland, Tichý oceán, Vietnam

Roste v Austrálii, Číně, Indii, Nepálu, Vietnamu a v Tichém oceánu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 25m. Větve jsou v mládí zpravidla zploštělé. Listy jsou eliptické až mírně vejčité (i kopinaté), špičaté až tupé, kožovité, dlouhé 5 - 30cm, široké 2,5 - 12cm, báze je protáhlá, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5cm. Květenstvím je úžlabní (i vrcholová) řídká lata délky 2,5 - 25cm, vlastní květy mají 1 - 6mm stopu, kalich délky 1mm, laloky vejčité, koruna je bílá nebo žlutá, dlouhá 2,5 - 5,5mm a laloky podlouhlé. Plodem je modře černá mírně vejčitá až eliptická peckovice délky 1 - 3cm a šířky 0,5 - 2,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *grandiflorus*/*Linociera ramiflora* var. *grandiflora* - květy mají 3 - 6mm stopku, koruna má laloky délky 3 - 5,5mm
- var. *ramiflorus*/*Linociera ramiflora* f. *pubisepala* - květy mají 1 - 5mm stopku, koruna má laloky délky 2,5 - 3mm

Chionanthus remotinervius

synonyma: *Linociera remotinervia*

Chionanthus retusus (Bělas nižší)

synonyma: *C. chinensis*, *C. coreanus*, *C. duclouxii*, *C. retusus* f. *coreanus*, *C. retusus* var. *coreanus*, *C. retusus* var. *fauriei*, *C. retusus* var. *mairei*, *C. retusus* var. *serrulatus*, *C. serrulatus*

oblasti: Japonsko, Korea, Tchaj-wan

Roste v Číně, Japonsku, Tchaj-wanu a Koreji v podobě keře nebo stromu s deštníkovitou korunou. Dorůstá výšky 2 - 10 (i 20)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou na stejném exempláři různě tvarované, podlouhlé, eliptické, vejčité až prakticky kulaté, zpravidla drobně pilovité, lesklé, zelené, dlouhé 3 - 12cm a široké 2 - 6,5cm. Květenstvím je řídká vrcholová lata délky 3 - 12cm, vlastní květy jsou bílé, kališní laloky kopinaté a korunní lístky dlouhé 1,2 - 2,5cm. Plodem je eliptická až vejčitá modrá peckovice délky 1 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Arnold's Pride' - výška i šířka do 9m; květy bohaté
- 'Botanicas Beauty' - květy bohaté, korunní lístky delší, více zahnuté
- 'China Snow' - výška 3 - 5,4m; listy lesklé, tmavě zelené; květy bohaté
- 'Ivory Tower' - vzpřímený sloupovitý habitus; výška 4,5m, šířka 1m; listy lesklé, zelené a dlouhé do 15cm; laly dlouhé do 12cm
- var. *serrulatus* - nižší hustější habitus; listy drobně pilovité
- 'Tokyo Tower' - úzce vzpřímený vázovitý habitus; výška 6m, šířka 3m; borka světle žlutá a

odlupující se; listy tmavě zelené, na podzim žluté; květenstvím je velký svazeček, vlastní květy jsou bílé; plody malé, modře černé

- 'Yadkin Creeper' - široce rozkladitý habitus; výška 1,8 - 3m, šířka 6m

Chionanthus riparius

synonyma: Linociera riparia

Chionanthus robinsonii

synonyma: C. verticillatus, Linociera robinsonii, Linociera verticillata

Chionanthus rostratus

synonyma: Linociera rostrata

Chionanthus rugosus

Chionanthus rupicola

synonyma: Linociera novoguineensis, Linociera ovalis, Linociera ramiflora var. coriacea, Linociera rupicola

Chionanthus sabahensis

Chionanthus salicifolius (Bělas vrbolistý)

synonyma: Linociera salicifolia

oblasti: Japonsko, Korea

Pochází z Japonska a Koreje.

Chionanthus sessiliflorus

synonyma: Linociera pallida, Linociera papuasica, Linociera sessiliflora

Chionanthus sleumeri

synonyma: Linociera coriacea, Linociera sleumeri

oblasti: Queensland

Pochází z Queenslandu, Austrálie.

Chionanthus sordidus

Chionanthus spicatus

synonyma: *Linociera spicata*, *Mayepea spicata*

Chionanthus spiciferus

synonyma: *Linociera spicifera*

Chionanthus stenurus

synonyma: *Linociera stenura*

Chionanthus subcapitatus

synonyma: *Linociera subcapitata*

Chionanthus subsessilis

synonyma: *Linociera subsessilis*

Chionanthus sulawesicus

Chionanthus sumatranus

synonyma: *Linociera sumatrana*

Chionanthus sutepensis

synonyma: *Linociera sutepensis*

Chionanthus tenuis

Chionanthus thorelii

synonyma: *Linociera procera*, *Linociera thorelii*

Chionanthus timorensis

synonyma: *Linociera timorensis*, *Mayepea timorensis*

Chionanthus trichotomus

synonyma: *C. arborea*, *Linociera arborea*, *Linociera glaziovii*, *Linociera glaziovii* var. *lanceolata*, *Linociera glomerata*, *Mayepea arborea*, *Mayepea pohliana*, *Minutia trichotoma*

Chionanthus urbanii

synonyma: *Linociera pubescens*, *Linociera urbanii*

Chionanthus vargasii

Chionanthus velutinus

synonyma: *Linociera velutina*

Chionanthus verruculatus

Chionanthus virginicus (Bělas viržinský)

synonyma: *C. angustifolius*, *C. cotinifolius*, *C. fragrans*, *C. heterophyllus*, *C. latifolius*, *C. longifolius*, *C. luteus*, *C. maritimus*, *C. montanus*, *C. obovatus*, *C. roseus*, *C. trifidus*, *C. triflorus*, *C. vernalis*, *C. vernus*, *C. virginicus* subsp. *maritimus*, *C. virginicus* var. *angustifolius*, *C. virginicus* var. *latifolius*, *C. virginicus* var. *maritimus*, *C. virginicus* var. *montanus*, *C. zeylanicus*, *Ligustrum cotinifolium*, *Linociera cotinifolia*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA v podobě vzdušného opadavého keře. Dorůstá výšky i šířky 3 - 6 (i 10)m. Na starších větvích se borka nepravidelně odlupuje. Větve jsou obloukovité, v mládí ochlupené, pupeny malé a špičaté. Listy jsou vstřícné, celokrajné, úzce vejčité až obvejčité, lesklé, zašpičatělé, tmavě zelené, na podzim žluté, v mládí na koncích větví hnědozelené až nafialovělé, dlouhé 8 - 20cm, báze je klínovitá a řapíky dlouhé 1 - 2,5cm. Květenstvím je převislá lata délky 10 - 20cm, vlastní květy jsou bílé, aromatické, korunní lístky jsou pentlicovité se zakulaceným koncem a délky 1,5 - 3cm. Plodem je tmavě modrá vejčitá peckovice délky 1,5 - 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Angustifolius' - listy úzce podlouhlé až kopinaté
- 'Emerald Knight' - listy tmavěji zelené
- 'Floyd' - hustější habitus; samčí
- var. *henryi* - listy užší, eliptické (i obvejčité nebo podlouhlé), tmavěji zelené; na zimu méně zimuvzdorné
- 'Latifolius'/Ch. *montanus* - listy eliptické až široce obvejčité, dlouhé do 15cm, široké 6 - 8cm a spodní strana je ochlupená
- var. *maritimus*/var. *pubescens* - listy podlouhlé až široce eliptické, oboustranně ochlupené, zelené; laty velmi řídké
- 'Pat's Variegated' - listy asymetricky světle žlutě křepinaté i s okraji
- 'Spring Fleecing' - stromovitý habitus; výška 3,6 - 6m; listy lesklé, tmavě zelené; květy bohaté; samčí

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, teplo a zásaditou humózní hlinitopísčitou vlhkou zeminu. Starší rostliny jsou mrazuvzdorné, mladší se musí chránit. Růst je ale velmi pomalý. Řez provádíme pouze v případě, že je nezbytný a to brzy na jaře anebo po odkvětu.

Množí se obvykle očkováním na *Fraxinus ornus* (Jasan zimář).

Chionanthus vitiensis

synonyma: *Linociera gillespiei*, *Linociera vitiensis*, *Olea vitiensis*

Chionanthus wurdackii

Chionanthus zeylanicus

synonyma: *C. dichotomus*, *C. zeylanicus* var. *dichotomus*, *Linociera dichotoma*, *Linociera purpurea* var. *dichotoma*, *Linociera zeylanica*

Chionanthus zollingerianus

synonyma: *Linociera zollingeriana*

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=378>

<http://www.garten.cz/a/cz/1929-chionanthus-virginicus-belas-virzinsky/>

http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=10373

<https://www.rostliny.net/>