

Osmanthus heterophyllus (Vonokvětka cesmínolistá)

synonyma: *Ilex heterophylla*, *Olea aquifolium*, *Olea aquifolium f. cuneata*, *Olea aquifolium f. subintegra*, *Olea aquifolium var. cuneata*, *Olea aquifolium var. ilicifolia*, *Olea aquifolium var. myrtifolia*, *Olea aquifolium var. rotundifolia*, *Olea aquifolium var. subintegra*, *Olea ilicifolia*, *Olea rotundifolia*, *Osmanthus acutus*, *Osmanthus aquifolium*, *Osmanthus aquifolium f. subangustatus*, *Osmanthus aquifolium var. argenteomarginatus*, *Osmanthus aquifolium var. argenteus*, *Osmanthus aquifolium var. atropurpureus*, *Osmanthus aquifolium var. aureovariegatus*, *Osmanthus aquifolium var. aureus*, *Osmanthus aquifolium var. ilicifolius*, *Osmanthus aquifolium var. myrtifolius*, *Osmanthus aquifolium var. purpureus*, *Osmanthus aquifolium var. rotundifolius*, *Osmanthus aquifolium var. variegatus*, *Osmanthus bibracteatus*, *O. f. subangustatus*, *O. var. acutus*, *O. var. bibracteatus*, *Osmanthus ilicifolius*, *Osmanthus ilicifolius f. aureomarginatus*, *Osmanthus ilicifolius f. aureus*, *Osmanthus ilicifolius f. myrtifolius*, *Osmanthus ilicifolius f. purpurascens*, *Osmanthus ilicifolius f. purpureus*, *Osmanthus ilicifolius f. rotundifolius*, *Osmanthus ilicifolius f. subangustatus*, *Osmanthus ilicifolius f. variegatus*, *Osmanthus ilicifolius var. argenteomarginatus*, *Osmanthus ilicifolius var. argenteovariegatus*, *Osmanthus ilicifolius var. aureomarginatus*, *Osmanthus ilicifolius var. aureovariegatus*, *Osmanthus ilicifolius var. aureus*, *Osmanthus ilicifolius var. bibracteatus*, *Osmanthus ilicifolius var. myrtifolius*, *Osmanthus ilicifolius var. purpurascens*, *Osmanthus ilicifolius var. purpureus*, *Osmanthus ilicifolius var. rotundifolius*, *Osmanthus ilicifolius var. subangustatus*, *Osmanthus ilicifolius var. undulatifolius*, *Osmanthus ilicifolius var. variegatus*, *Osmanthus integrifolius*, *Osmanthus myrtifolius*, *Osmanthus purpureus*, *Osmanthus rotundifolius*

čeleď: Oleaceae

Dorůstá výšky až 4m. Kvete pozdě, až v září a říjnu. Jak český název napovídá, listy má velmi podobné cesmíně. Na té ale listy vyrůstají střídavě. Stejně jako na ní jsou listy lesklé, tmavě zelené a kraj je ostře pilovitý. Plodem je modrá kulička o průměru 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Gulf tide' - husté prohnuté listy s ostrým pilovým krajem
- 'Tricolor'
- "Variegatus" - krémové panašování krajů

Vyhovuje mu mírně kyselá půda, chráněné a teplé místo.