

Eriophorum (Suchopýr)

čeleď: Cyperaceae

Roste na severní polokoulí a jižní Africe jako trvalka. Listy jsou trávovité. Kvete v kláscích, okvětí má více než 8 štětin (suchopýrky pouze 4 - 6) a květy jsou oboupohlavné. Plodem je 3hranná nažka ozdobená střapečky z chmýří a dopomáhají tak semenům k létání. Nejznámějším druhem je E. angustifolium.

Vyhovují mu bažinatá a vlhká místa nebo i zatopená místa s hloubkou do 5cm.

Množí se dělením trsů.

Eriophorum altaicum

oblasti: Kolorado, Montana, Utah, Wyoming

Eriophorum angustifolium (Suchopýr úzkolistý)

synonyma: E. angustifolium subsp. subarcticum, E. angustifolium var. angustifolium, E. angustifolium var. congestum, E. angustifolium var. elatius, E. angustifolium var. gracile, E. angustifolium var. laxum, E. angustifolium var. minus, E. gracile, E. paniculatum, E. polystachion subsp. congestum, E. polystachion subsp. minus, E. polystachion var. angustifolium, E. polystachion var. elatius, E. vulgare, Linagrostis paniculata, Linagrostis vulgaris, Plumaria angustifolia, Scirpus angustifolius, Scirpus speciosus

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Polsko, Quebec, Rakousko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Švýcarsko, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste na severní polokouli. Dorůstá výšky 0,2 - 0,6 (i 1)m. Pod povrchem vytváří plazivý oddenek. Listy mají čárkováný tvar s načervenalým koncem a horní lodyžní mají prodlouženou špičku. Kvete v převislých kláscích (zpravidla 5ks/stéblo) v kruželi s bílým chmýrem délky 3 - 4cm, stopky má hladké, částečně převislé a v horní části tupě 3hranné.

Často vyrůstá na okrajích rašelinišť a živinami chudých slatinistech. Pro pěstování ve vodních zahradách je nejhodnější, protože vyniká krásou i odolností. Vyhovují mu vlhké kyselé půdy, ideálně rašeliniště. Roste o hranič hladiny do 10cm nad ní. Negativní vlastností je rozpínavost, tj. až plevelné rozrůstání pomocí podzemních výběžků. Doporučuje se proto vymezit mu prostor. Pokud jej neomezíte, budou jeho porosty vytvářet kola o průměru 4,5 (i 12)m (na vnitřní straně odumírá, na vnější přirůstá).

Eriophorum beringianum

Eriophorum brachyantherum

synonyma: E. brachyantherum var. brachyantherum, E. brachyantherum var. pellucidum, E. opacum

, E. opacum var. cinnamomeum, E. vaginatum subsp. opacum, E. vaginatum var. brachyantherum, E. vaginatum var. opacum, Scirpus brachyantherus

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Labrador, Manitoba, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Yukon

Eriophorum callitrix

synonyma: E. callitrix f. moravium, E. callitrix var. callitrix, E. callitrix var. moravium, E. callitrix var. pallidus

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Labrador, Manitoba, Montana, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Wyoming, Yukon

Eriophorum chamissonis (Suchopýr červenavý)

synonyma: E. altaicum var. neogaeum, E. aquatile, E. chamissonis f. albidum, E. chamissonis f. chamissonis, E. chamissonis f. turneri, E. chamissonis subsp. albidum, E. chamissonis subsp. aquatile, E. chamissonis var. albidum, E. chamissonis var. aquatile, E. chamissonis var. chamissonis, E. chamissonis var. subalbidum, E. eximum, E. intermedium, E. mandshuricum, E. mandshuricum subsp. sibiricum, E. rufescens, E. russeolum, E. russeolum f. leucothrix, E. russeolum f. subalbidum, E. russeolum subsp. albidum, E. russeolum subsp. leiocarpum, E. russeolum subsp. rufescens, E. russeolum var. albidum, E. russeolum var. aquatile, E. russeolum var. fallax, E. russeolum var. leucothrix, E. russeolum var. majus, E. strigosum, Scirpus chamissonis, Scirpus russeolus

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Kolorado, Labrador, Manitoba, Minnesota, Montana, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Pochází ze Severní Ameriky a Sibiře. Má červenavé střapečky rezavého chmýří, čímž se liší od ostatních bílých druhů.

Roste v rašeliništích.

Eriophorum churchillianum

Eriophorum comosum

oblasti: Afganistán, Čína, Írán, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Vietnam, Z Himálaj

Roste v Íránu, Afganistánu, Pakistánu, Himálaji, Myanmaru, Číně a Vietnamu jako trvalka. Dorůstá výšky 15 - 45 (i 70)cm. Stonek má průměr 1 - 2mm. Listy mají až 5cm hnědou pochvu, jsou šedozelené, špičaté, dlouhé více než 50cm, široké 0,5 - 4mm. Květenství má velikost 5 - 12cm, klásky jsou dlouhé 0,5 - 1,4cm a široké 2 - 3mm. Plody jsou dlouhé 3 - 3,4mm a široké 0,3 - 0,6mm.

Eriophorum crinigerum

oblasti: Kalifornie, Oregon

Eriophorum fellowsii

synonyma: *E. viridicarinatum* f. *fellowsii*, *E. viridicarinatum* var. *fellowsii*

Eriophorum gracile (Suchopýr štíhlý)

synonyma: *E. asiaticum*, *E. coreanum*, *E. gracile* subsp. *asiaticum*, *E. gracile* subsp. *coreanum*, *E. gracile* subsp. *hoefftii*, *E. gracile* var. *caurianum*, *E. gracile* var. *coreanum*, *E. gracile* var. *gracile*, *E. gracile* var. *paucinervium*, *E. hoefftii*, *E. pallidum*, *E. paucinervium*, *E. triquetrum*, *Scirpus ardea*, *Scirpus ardea* var. *coreanus*

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Bulharsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Dorůstá výšky 10 - 50 (i 60)cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Lodyžní listy jsou prakticky celé 3hranné a široké 1 - 2mm. Květenství tvoří 3 - 5 klásků délky 1cm, plevy jsou nažloutlé nebo zelenohnědé a mnohožilné. Patří mezi vzácnější druhy C1.

Vyhovují mu přechodová rašeliniště, prameniště a slatiny.

Eriophorum gracilifolium

Eriophorum humile

Eriophorum japonicum

Eriophorum latifolium (Suchopýr široolistý)

synonyma: *Carex alopecurus*, *E. depauperatum*, *E. latifolium* var. *congestum*, *E. polystachion* var. *latifolium*, *E. pubescens*, *E. vulgare*, *Plumaria latifolia*, *Scirpus angustifolius* subsp. *latifolius*

oblasti: Bulharsko, Česká republika, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Švýcarsko

Roste v trsech bez výběžků. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 60 (i 70)cm. Horní lodyžní listy mají plochou čepel šířky 3 - 8mm s krátkou a někdy i kápovitou špičkou. Květenstvím je 2 - 12 klásků s drsnou stopkou, plevy jsou hnědočervené, hnědé až hnědočerné a jednožilné. Patří mezi vzácné druhy C2.

Roste o hranice hladiny do 10cm nad ní. Vyhovují mu slatiny, rašeliniště a prameniště. Je ale i vápnorník.

Eriophorum medium

synonyma: *E. gauthieri*, *E. intercedens*, *E. medium* subsp. *album*

Eriophorum microstachyum

oblasti: Pákistán

Eriophorum polystachiovaginatum

synonyma: E. beauverdii, E. churchillianum

Eriophorum porsildii

Eriophorum pylaeianum

synonyma: E. porsildii

Eriophorum rousseauianum

synonyma: E. sorensenii

Eriophorum scabriculme

synonyma: Scirpus scabriculmis

Eriophorum scheuchzeri (Suchopýr Scheuchzerův)

synonyma: E. altaicum, E. capitatum, E. leucocephalum, E. scheuchzeri subsp. altaicum, E. scheuchzeri subsp. arcticum, E. scheuchzeri var. scheuchzeri, E. scheuchzeri var. tenuifolium, E. sphaerocephalum, Plumaria scheuchzeri, Scirpus leucocephalus, Scirpus scheuchzeri

oblasti: Alberta, Aljaška, Altaj, Britská Kolumbie, Grónsko, Itálie, Kašmír, Katalánsko, Labrador, Manitoba, Montana, Německo, Newfoundland, Nové Mexiko, Nunavut, Ontario, Pákistán, Quebec, Rakousko, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Utah, Wyoming, Yukon

Roste cirkumpolárně a v horách jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Stonek má průměr 1 - 1,5mm a ve spodní části mívá 1 - 2 kolénka. Listy jsou přízemní, mají až 5cm pochvu, délku do 10cm, šířku do 2mm, lodyžních bývá pouze 1 - 2ks a jsou zakrnělé. Květenství je kulovité, průměru 2,5 - 3,5cm. Plody jsou úzce obvejčité, zploštěle 3hranné, hnědé, často mírně zahnuté, dlouhé 1,7 - 2mm a široké 0,5 - 0,7mm.

Eriophorum tenellum

synonyma: E. strictum, E. tenellum f. axillare, E. tenellum f. gorhami, E. tenellum f. tenellum, E. tenellum var. monticola, E. tenellum var. tenellum

oblasti: Connecticut, Illinois, Labrador, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Vermont, Wisconsin

Eriophorum tolmatchevii

Eriophorum transiens

Eriophorum vaginatum (Suchopýr pochvatý)

synonyma: E. caespitosum, E. caespitosum var. humilius, E. callithrix, E. callitrix var. erubescens, E. fauriei, E. kernerii, E. scabridum, E. spissum, E. spissum var. erubescens, E. vaginatum f. erubescens, E. vaginatum subsp. fauriei, E. vaginatum subsp. spissum, E. vaginatum subsp. vaginatum, E. vaginatum var. fauriei, E. vaginatum var. spissum, Linagrostis vaginata, Plumaria vaginata, Scirpus fauriei, Scirpus fauriei subsp. vaginatus, Scirpus vaginatus

oblasti: Alberta, Aljaška, Arménie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Indiana, Irsko, Itálie, Katalánsko, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Pensylvánie, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Vermont, Wisconsin, Yukon

Roste v trsech a časem vytváří bulty. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 40 (i 80)cm. Listy jsou sítinovité. Na vrcholu lodyhy vytváří jediný přímý klásek.

Roste v rašeliništích od hranice hladiny do 10cm nad ní.

Eriophorum virginicum

synonyma: Eriophoropsis virginica, E. confertissimum, E. virginianum, E. virginicum f. album, E. virginicum f. virginicum, E. virginicum var. album, E. virginicum var. confertissimum, E. virginicum var. gracile, Scirpus virginicus

oblasti: Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pensylvánie, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Eriophorum viridicarinatum

synonyma: E. latifolium var. viridicarinatum, E. viridicarinatum f. viridicarinatum

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pensylvánie, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste na severu Severní Ameriky.

Eriophorum x beringianum

oblasti: Aljaška

Eriophorum x churchillianum

oblasti: Aljaška

Eriophorum x fellowsii

Eriophorum x gracilifolium

Eriophorum x medium

oblasti: Labrador, Newfoundland, Quebec

Eriophorum x polystachiovaginatum

Eriophorum x porsildii

oblasti: Aljaška, Ontario

Eriophorum x pylaeanum

oblasti: Aljaška, Labrador, Newfoundland, Nové Skotsko, Ontario, Quebec

Eriophorum x rousseauanum

oblasti: Aljaška

Eriophorum x rousseauianum

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K705.php>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Suchop%C3%BDr>

http://hobby.idnes.cz/suchopyr-uzkolisty-eriophorum-angustifolium-flc-/herbar.asp?c=A080730_162606_herbar_lud

<https://www.rostliny.net/>