

Asparagus racemosus (Chřes čtyřhranný)

synonyma: Asparagopsis abyssinica, Asparagopsis acerosa, Asparagopsis brownii, Asparagopsis decaisnei, Asparagopsis hohenackeri, Asparagopsis javanica, Asparagopsis retrofracta, Asparagopsis subquadrangularis, Asparagus dubius, Asparagus jacquemontii, Asparagus penduliflorus, Asparagus petitianus, A. var. javanicus, A. var. longicladodius, A. var. subacerosus, A. var. tetragonos, A. var. zeylanicus, Asparagus stachyoides, Asparagus tetragonos, Asparagus zeylanicus, Protasparagus jacquemontii, Protasparagus racemosus, Protasparagus racemosus var. javanicus, Protasparagus racemosus var. subacerosus, Protasparagus zeylanicus

čeleď: Asparagaceae

oblasti: Afrika, Austrálie, Bhútán, Kašmír, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Sikkim, Srí Lanka

Roste v Austrálii, Malajsii, Myanmaru, Indii, Bhútánu, Nepálu, Kašmíru, Pakistánu a Africe v podobě šplhající trvalky nebo polokeře. Větve jsou mírně 4hranné. Listy mají ostré ostruhy délky 1,5 - 2cm na hlavním stonku a na větvích jsou kratší, dlouhé 0,5 - 1cm. Fylokádia vyrůstají po 3 - 5 (i 8)ks, jsou čárkovitá, dlouhá 1 - 2cm a široká 0,5mm. Květenstvím je bohatý hrozen nebo lata délky do 8cm, vlastní květy jsou oboupohlavné, mají 3 - 4mm stopku, korunní lístky jsou bílé, dlouhé 8mm a široké 1,5mm. Kořeny lze konzumovat.

<https://www.rostliny.net/>