

Linaria vulgaris (Lnice květel)

synonyma: *Antirrhinum commune*, *Antirrhinum genistifolium*, *Antirrhinum glandulosum*, *Antirrhinum linaria*, *Antirrhinum linaria* var. *peloria*, *Antirrhinum linarioides*, *Antirrhinum linifolium*, *Antirrhinum ochroleucum*, *Antirrhinum versicolor*, *Linaria ciliata*, *Linaria elongata*, *Linaria gebleri*, *Linaria linaria*, *Linaria linarioides*, *Linaria linifolia*, *Linaria pensylvanica*, *Linaria perrieri*, *Linaria racemosa*, *Linaria speciosa*, *Linaria versicolor*, *Linaria vulgariformis*, L. f. *peloria*, L. f. *vulgaris*, L. var. *communis*, *Peloria linaria*

čeleď: Scrophulariaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Labrador, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Středozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Asie, Západní Virginie

Roste v Evropě, středozemí, západní Asii i jinde jako vzpřímená a větvená trvalka. Dorůstá výšky 20 - 60 (i 90)cm. Lodyhy jsou červeně hnědé a mohou být v horní části ochlupené. Listy jsou přisedlé, střídavé, úzce kopinaté až čárkovité, špičaté, s lehce podvinutými, modře zelenými, s 1 (i 3)mi žilkami, dlouhé (1,5 -) 2 - 6cm a široké 0,1 - 0,5 (i 1,5)cm. Květenstvím je hustý 10 - 50tičetný hrozen, vlastní květy mají 0,2 - 1,3cm stopku, jsou žluté, 5tičetné, dlouhé 2,5 - 3,5cm s oranžovou skvrnou na spodním pysku, kališní laloky jsou kopinaté až vejčité, špičaté nebo zašpičatělé a dlouhé 2 - 3mm. Plodem je vejčitá až podlouhlá tobolka délky 0,5 - 1,1cm, šířky 4 - 7mm a obsahuje diskovitá okřídlená černá semena velikosti 1,8 - 3mm. Využívá se v léčitelství. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *acutiloba*

Vyhovují jí štěrkovité a písčité zeminy na plném slunci, okraje zdí, náspy, pole, okraje cest, atp. a teplo.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>