

Butomus umbellatus (Šmel okoličnatý)

čeleď: Butomaceae

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Katalánsko, Kazachstán, Maine, Manitoba, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Severní Dakota, Švýcarsko, Vermont, Wisconsin

Roste v Evropě a Asii jako trvalka. Dorůstá výšky až 0,5 - 1,2 (i 1,5)m a šířky do 60cm. Patří mezi trvalky. Pod vodou vytváří silný krátce plazivý oddenek. Stvol je přímý. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou čárkovité, na řezu 3hranné, dlouhé 0,3 - 1,5m a široké 6 - 9mm. Kvete efektními růžovými květy v tvaru zdánlivého 15 - 30tičetného okolíku (správně o šroubel), mají 2 - 3 listeny délky do 2,5cm, šířky 6 - 8mm, kalich i koruna je 3četná, světlerůžová až růžová a z vnější strany může být nazelenalá. Plodem je 6 pukavých měchýřků. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovuje ji plné slunce, rákosiny, bahno, stojaté nebo pomalu tekoucí vody s hloubkou do 50cm. Pokud nekvete, je potřeba trs rozdělit.

Množí se semeny nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>