

# Crossandra infundibuliformis

synonyma: *Crossandra axillaris*, *Crossandra coccinea*, *C. subsp. axillaris*, *C. var. axillaris*, *Crossandra nutans*, *Crossandra oppositifolia*, *Crossandra undulifolia*, *Harrachia spinosa*, *Justicia infundibuliformis*, *Ruellia infundibuliformis*

čeleď: Acanthaceae

oblasti: J Indie, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko, V Indie

Pochází z Indie, Thajska a Srí Lanky. Roste v podobě stálezeleného polokeře až keře. Dorůstá výšky až 0,5 - 1 (i 1,5)m. Listy jsou vejčitěeliptické až kopinaté, špičaté, lesklé, tmavězelené, zvlněné, dlouhé 5 - 10 (i 12)cm, široké 2 - 5cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 4cm. Květy jsou vějířovité, růžovočervené až oranžové, seskupené do hustých kuželovitých hranatých až 10cm dlouhých klasů, listeny jsou ochlupené, kopinaté, dlouhé 0,7 - 1,3 (i 1,5)cm, trubka má délku 2,5cm, pysk je dlouhý 1,5 - 2,5cm. Plodem je podlouhlá tobolka délky 1 - 1,2cm obsahující 4 semena délky 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Mona Wallhed' - výška do 50cm; listy lesklé, zelené; květy tmavě růžovočervené
- 'Ruser's Auslese' - květy červenooranžovorůžové

Vyhovuje jí slunném místě. Uchovávejte ve vlhké a pravidelně hnojené zemi za pokojové teploty. Starší rostliny mohou vyrůst větších rozměrů, obvykle se ale začínají pěstovat ze semen nebo se ořezávají. Má ráda rosení. Na zimu zálivku omezte. Přesazuje se v únoru a březnu. Hlavní výhony se zkrátí a ty se posléze rozvětví. Minimální teplota pěstování je 10°C.

Množí se řízký, které vsadíme do půdy se směsí rašeliny a písku. Po zformování kořenů můžeme přesadit do hlubšího květináče, kde nám již vykvetou. Semena se vysévají na jaře také do písčitorašelinné půdy.

Další informace:

<http://www.celysvet.cz/crossandra.php>

<https://www.rostliny.net/>