

Amaryllis (Amaryllis)

čeleď: Amaryllidaceae

Pochází z jižní Afriky. Podobá se rodu

Hippeastrum

, ten ale pochází z tropů a subtropů Ameriky. Kvete velkými zvonovými květy na tlustém stonku. Patří mezi květiny vhodné pro řez.

Dokud se nevytvoří listy, zálivka postačí omezená. S mečovitými listy již zalévejte více. Důležité je také dopřát rostlině dostatek tepla. Přezimování musí být v nezamrzajícím místě s minimální zálivkou a na světle. Přihnojujeme pravidelně každý týden tekutým hnojivem do poloviny srpna. Pak se seříznou listy 2 - 3cm nad cibulí a tu pak umístěte do chladnějšího místa na 8 - 12 týdnů. Pozor, aby nevyschla! Přesazuje se až v okamžiku, kdy je to nezbytně nutné.

Množí se cibulemi (o velikosti 8 - 10cm), které se zasazují tak, aby vrchol zůstal nad zemínou.

Amaryllis bagnoldii

synonyma: Habranthus bagnoldianus

oblasti: Čile, Jižní Amerika, Z Jižní Amerika

Amaryllis belladonna (Amarylka zlomocná)

synonyma: A. blanda, A. longipetala, A. obliqua, A. pallida, A. pudica, A. regalis, A. rosea, Belladonna blanda, Belladonna pallida, Belladonna pudica, Belladonna purpurascens, Brunsvigia blanda, Brunsvigia major, Brunsvigia rosea, Brunsvigia rosea var. blanda, Brunsvigia rosea var. elata, Brunsvigia rosea var. longipetala, Brunsvigia rosea var. major, Brunsvigia rosea var. minor, Brunsvigia rosea var. pallida, Brunsvigia rosea var. pudica, Callicore rosea, Coburgia belladonna, Coburgia blanda, Coburgia pallida, Coburgia pudica, Coburgia rosea, Imhofia rosea, Leopoldia belladonna, Zephyranthes pudica

oblasti: Afrika, J Afrika, J USA, Jihoafrická Republika (JAR), JZ USA, Kalifornie, Kapsko, Louisiana, Severní Amerika, Střední Severní Amerika, USA

Pochází z JAR. Kvete růžovými zvonovými květy. Existuje velké množství kultivarů s různou barvou a tvarem květu.

Amaryllis condemaita

Amaryllis paradisiicola

Amaryllis vittata

<http://www.rostliny.net/>