Semiarundinaria (Polorákosovec)

čeleď: Poaceae

Existuje asi 20 druhů. Pochází z Japonska a jižní Asie. Délka listů se pohybuje do 20cm a má příčné žilkování.

Semiarundinaria densiflora
synonyma: Arundinaria densiflora, Brachystachyum densiflorum, Brachystachyum densiflorum var. villosum, Fargesia densiflora, S. densiflora f. villosa

Semiarundinaria fastuosa
synonyma: Arundinaria fastuosa, Arundinaria narihira, Bambusa fastuosa, Phyllostachys fastuosa, S. fastuosa, S. fastuosa f. viridis, S. fastuosa var. viridis, S. viridis

oblasti: Čína, Japonsko

Pochází z teplých a subtropických oblastí Číny a Japonska. Dorůstá výšky 6 - 8 (i 10)m při průměru 2 - 4cm. Stébla jsou po celý rok zelená, na slunci se mohou barvit do červena. Z kolének vyrůstají 3 - 4 větvičky. Listy mají délku 10 - 15cm a šířku 2 - 2,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Viridis' - dorůstá výšky 10 - 12 (i 14)m, průměr stébel 3 - 4cm a na slunci hnědnou, odolává teplotám do -25°C.

Potřebuje chráněná místa. Odolává teplotám do -20°C.

Semiarundinaria fortis
synonyma: S. fortis f. nebulosa

Semiarundinaria kagamiana
synonyma: Arundinaria fastuosa var. kagamiana, S. fastuosa var. kagamiana

Semiarundinaria shapoensis

Semiarundinaria sinica

Semiarundinaria yashadake
synonyma: Arundinaria fastuosa var. yashadake, S. fastuosa var. yashadake

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Kimmei'

https://www.rostliny.net/