Ceraria

čeleď: Portulacaceae

Roste v JAR a Namibii v podobě sukulentního poloopadavého řídce větveného keře. Listy jsou drobné, šedozelené, přisedlé a kyjovité. Kvete růžovými nebo bílými 5tičetnými květy.

Vyhovují ji štěrkovité půdy a nízká zálivka. Růst je pomalý.

Množí se řízky.

Ceraria carrissoana

Ceraria evora

Ceraria fruticulosa

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě větveného keře. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Větve jsou štíhlé a červenohnědé. Listy jsou zploštělé, obvejčité, drobně hrotité a dlouhé 4 - 6mm.

Ceraria gariepina

Ceraria kaokoensis

Ceraria kuneneana

Ceraria longipedunculata

Ceraria namaquensis

synonyma: C. gariepina, Namaqualand ceraria, Portulacaria armiana, Portulacaria namaquensis

oblasti: Namaqualand, Namibie

Pochází z Jihoafrické Republiky a Namibie. V přírodě tvoří husté sukulentní keře, které dorůstají výšky 2 - 5m. Starší exempláře pokrývá zlatavá kůra, která se odlupuje, zatímco mladší exempláře mají kůru světle šedivou. Celý kmínek je pokrytý drobnými sukulentními šedozelenými dužnatými lístečky ve tvaru kyje dlouhého 2 - 5mm, široké max. 2mm a říká se jim brachyblasty. Pokud zrovna rostlina prochází obdobím sucha, lehce opadávají, ale po přísunu vody opět rychle narůstají. Květenství je úžlabní, růžové, má 2 kališní lístky, 5 korunních hvězdicovitých lístků a samčí i samičí květy mají 5 tyčinek. Plody jsou drobné, růžově okřídlené. V domovině kvete od podzimu do jara drobnými růžovými květy s 5ti korunními lístky.

Daří se jim dobře při naroubování na druh Portualacaria afra, neboť jinak trpí velkou citlivostí na přemokření. Doporučuje se časté zaštipování výhonů pro docílení bohatšího větvení.

Ceraria pygmaea

synonyma: Portulacaria pygmaea

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR v podobě zakrslého vidličnatě větveného keře. Dorůstá výšky 20cm, ale tloušťka může být až 30cm. Lístky vyrůstají na celé délce větviček, jsou drobné, vejčitě klínovité, zaoblené až zahrocené, modrozelené až žlutozelené a dlouhé 0,1 - 1,4cm. Kvete drobnými bílými nebo narůžovělými květy na starších rostlinách.

Podobně jako druh C. namaquensis, tak i tento se pěstuje naroubovaný na Portulacaria afra. Není však tolik nutné, protože není tolik náchylný na přelití.

Ceraria schaeferi

Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1855

https://www.rostliny.net/