

# Epilobium latifolium

synonyma: Chamaenerion halimifolium, Chamaenerion latifolium, Chamaenerion latifolium var. albiflora, Chamaenerion latifolium var. grandiflorum, Chamaenerion latifolium var. megalobum, Chamaenerion latifolium var. parviflora, Chamerion latifolium, Epilobium changaicum, Epilobium corymbosum, Epilobium frigidum, Epilobium grandiflorum, Epilobium halleri, Epilobium humile, Epilobium kamtschaticum, Epilobium kesamitsui, E. f. leucanthum, E. f. munzii, E. subsp. leucanthum, E. var. albiflorum, E. var. album, E. var. tetrapetalum, Epilobium pauciflorum, Epilobium rhexiiflorum, Epilobium venustum

čeleď: Onagraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Evropa, Grónsko, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kamčatka, Kazachstán, Kolorado, Labrador, Manitoba, Montana, Nevada, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Oregon, Pákistán, Quebec, Severozápadní Teritorium, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v severních částech Eurasie, v USA, Kanadě a Grónsku jako trvalka. Dorůstá výšky 4 - 45 (i 70)cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Stonky jsou bývají jednoduché. Listy vyrůstají ve spirále, jsou eliptické až mírně kopinaté, dlouhé 1 - 4,5 (i 7,5)cm, široké 0,5 - 1,5 (i 2,5)cm a max. krátce řapíkaté. Květenství je vzpřímené 1 - 7 (i 12)tikvěté, vlastní květy mají 1 - 1,8cm stopku, jsou nálevkovité, kališní lístky špičaté, dlouhé 1,1 - 1,6cm, široké 3 - 3,8mm, korunní lístky jsou růžové až růžovofialové, dlouhé 1,3 - 3,2cm a široké 0,6 - 2,3cm. Plodem je tobolka délky 4,5 - 7,5cm n a 1 - 1,8cm stopce a obsahuje zašpičatělá semena délky 1,3 - 2,1mm a šířky 0,45 - 0,6mm s chmýrem délky 0,9 - 1,2cm.

Vyhovují ji lesní paseky.

<https://www.rostliny.net/>