

Achillea millefolium (Řebříček obecný)

synonyma: *Achillea albida*, *Achillea alpicola*, *Achillea ambigua*, *Achillea anethifolia*, *Achillea angustissima*, *Achillea arenicola*, *Achillea bicolor*, *Achillea borealis*, *Achillea borealis f. fusca*, *Achillea borealis subsp. arenicola*, *Achillea borealis subsp. californica*, *Achillea borealis var. arenicola*, *Achillea borealis var. californica*, *Achillea californica*, *Achillea ceretanica*, *Achillea compacta*, *Achillea coronopifolia*, *Achillea crassifolia*, *Achillea cristata*, *Achillea cuspidata*, *Achillea dentifera*, *Achillea eradiata*, *Achillea fusca*, *Achillea gigantea*, *Achillea gracilis*, *Achillea haenkeana*, *Achillea intermedia*, *Achillea lanata*, *Achillea lanulosa*, *Achillea lanulosa f. peroutkyi*, *Achillea lanulosa f. rubicunda*, *Achillea lanulosa subsp. alpicola*, *Achillea lanulosa subsp. megacephala*, *Achillea lanulosa var. alpicola*, *Achillea lanulosa var. arachnoidea*, *Achillea lanulosa var. eradiata*, *Achillea laxiflora*, *Achillea magna*, *Achillea marginata*, *Achillea megacephala*, *A. f. albiflora*, *A. f. californica*, *A. f. discolor*, *A. f. iserana*, *A. f. rhodantha*, *A. f. rosea*, *A. f. roseiflora*, *A. f. roseoides*, *A. f. rubicunda*, *A. subsp. atrotégula*, *A. subsp. balearica*, *A. subsp. borealis*, *A. subsp. compacta*, *A. subsp. lanulosa*, *A. subsp. occidentalis*, *A. var. alpicola*, *A. var. arenicola*, *A. var. asplenifolia*, *A. var. borealis*, *A. var. californica*, *A. var. colliniformis*, *A. var. dipetala*, *A. var. dissecta*, *A. var. fusca*, *A. var. gigantea*, *A. var. iserana*, *A. var. lanulosa*, *A. var. litoralis*, *A. var. lobata*, *A. var. maritima*, *A. var. megacephala*, *A. var. nigrescens*, *A. var. occidentalis*, *A. var. pacifica*, *A. var. puberula*, *A. var. rosea*, *A. var. sordida*, *A. var. spathulata*, *Achillea nabelekii*, *Achillea occidentalis*, *Achillea ochroleuca*, *Achillea ossica*, *Achillea pacifica*, *Achillea palmeri*, *Achillea pecten-veneris*, *Achillea pratensis*, *Achillea pseudo-tanacetifolia*, *Achillea puberula*, *Achillea pumila*, *Achillea rosea*, *Achillea setacea*, *Achillea sordida*, *Achillea subalpina*, *Achillea subhirsuta*, *Achillea submillefolium*, *Achillea sylvatica*, *Achillea tanacetifolia*, *Achillea tenuifolia*, *Achillea tenuifolia var. albicaulis*, *Achillea tenuis*, *Achillea tomentosa*, *Achillea virgata*, *Achillios millefoliatus*, *Alitubus millefolium*, *Alitubus tomentosus*, *Chamaemelum millefolium*, *Chamaemelum tanacetifolium*, *Chamaemelum tomentosum*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Labrador, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Ťan-šan, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Pochází z Evropy, Asie i Severní Ameriky. Patří mezi krátkověké trvalky. Pod zemí vytváří plazivý oddenek délky 3 - 50 (i 60)cm, občas i s vystoupavými výběžky. Povrch je ochlupený. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,2 - 0,7 (i 1)m, bývá hranatý a v průměru má na bázi 3 - 8mm. Listy jsou střídavé, kopinaté až čárkovité, krátce řapíkaté, 2 - 3x peřenosečné, 3 - 12x delší než široké, rozložené do roviny až nápadně 3rozměrné a přízemní zpravidla přisedlé. Kvete bílými nebo světle růžovými květy ve vrcholičnatých úborech o průměru 4 - 10 (i 15)cm, složenými z 10 - 20tičetných disků, zákrovní listeny hnědozelené až tmavěhnědé s hnědým okrajem, zpravidla ochlupené, vlastní květy jsou v úboru, mají 4 - 6 okvětních lístků se 3mi laloky na vrcholu, délku 1,5 - 2,5mm a šířku 1,5 - 3mm. Plodem je nažka bez chmýru. Patří mezi chráněné rostliny C4. Vydává aromatickou vůni. Listy lze je použít pro dezinfikaci ran, kůže se pak ale při častém používání může stát citlivější na světlo. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Apfelblüte' - květy tmavě růžové
- 'Apricot Delight'
- 'Cerise Queen' - květy růžové

- 'Dark Velvet' - květy tmavě růžové
- subsp. *elbursensis*
- 'Fanal'/'The Beacon' - květy červené až světlečervené
- 'Grapefruit'
- 'Heidi' - červené květy
- 'Hoffnung' - nažloutlé květy
- subsp. *chitralensis*
- 'Lachsschoönheit' - lososové květy
- 'Lilac Beauty' - lila květy
- 'Paprika' - květy oranžovočervené, blednoucí
- subsp. *millefolium* (Řebříček obecný pravý) - výška 0,2 - 1m; zákrovní listeny mají hnědozelené až světlezelené okraje (i tmavěhnědé); louky, paseky, okraje cest
- 'Pink'
- 'Pomegranate'
- 'Red Beauty' - listy stříbřité, květy růžovočervené
- 'Rosea' - květy růžové
- 'Schwefelblüte' - žluté květy
- subsp. *sudetica* (Řebříček obecný sudetský) - výška 10 - 25cm; povrch hustě ochlupený; bílé květy, zákrovní listeny na okraji zpravidla tmavěhnědé; horské louky
- 'Summer Pastels' - různé barvy květů
- 'Summer Wine' - červené vínové květy
- 'Wesersandstein' - hnědočervené květy
- 'White Queen' - bílé květy

Vyhovují ji suché louky a pastviny, okraje cest, paseky, atp. na propustné sušší dusíkaté kamenité nebo písčité půdě.

Množí se oddenky.

<https://www.rostliny.net/>