

Zamia fischeri

synonyma: *Palmifolium fischeri*, *Zamia forsteri*, *Zamia tenuifolia*

čeleď: *Zamiaceae*

oblasti: Střední Mexiko, Tamaulipas

Pochází ze středního Mexika a je to endemit. Je často zaměňovaný s druhem *Z. vasquezii*. Nálevkovitý kmen dorůstá do délky 10 - 15 (i 30)cm, 8cm do šířky a je hlízovitý, podzemní. Listy vyrůstají po 3 - 5 (i 10)ks, jsou tmavězelené, dlouhé 33 - 55cm, široké 10 - 16cm, zpeřené, tmavězelené, tvořené 10 - 23mi páry lístků, vlastní lístky jsou zašpičatělé, dlouhé 5 - 8cm, široké 1,2 - 1,6cm, mírně podvinuté, vrcholové částečně pilovité a řapíky jsou kulaté, dlouhé 7,5 - 10cm. Samičí šištice vyrůstají samostatně, jsou vzpřímené, dlouhé 5 - 12,5cm, široké 4,5 - 5cm, v mládí šedohnědě plstnaté, mají 2 - 2,5cm stopku, samčí šištice vyrůstají po 1 - 3ks, jsou vzpřímené, později poléhavé, dlouze kuželovité, šedohnědě plstnaté, dlouhé 7 - 11,5cm, široké 2 - 2,3cm a mají 1,3 - 2cm stopky.

Při pěstování jim vyhovují pokojové teploty. Jsou náchylné k přelití při teplotách pod 15°C.

<https://www.rostliny.net/>