

# Huernia (Huernia)

čeleď: Apocynaceae

Roste v jižní a východní Africe v podobě sukulentní trvalky. Dorůstá výšky do 15cm. Jsou typické žebnatými bezlistými stonky pokryté zašpičatělými dužnatými výstupky. Podobají se rodu Stapelia. Občas jejich květy vydávají silný zápach podobný zápachu z mršiny, jsou zvonkovité, 5ti laločné, průměru až 3,5cm a různě skvrnité. Nejznámějším druhem je H. zebrina.

Vyhovuje jim lehká písčité dobře propustná středně úrodná půda, mírná zálivka, polostín a teplo. V domovině se vyskytují na skalnatých místech.

Množí se semeny nebo řízků.

## Huernia albomaculata

## Huernia anagaynensis

## Huernia andreaeana

## Huernia archeri

## Huernia asirensis

## Huernia aspera

Kvete tmavěfialovými květy.

## Huernia baradii

## Huernia barbata

Kvete nažloutlými květy s fialovými skvrnami a středem. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. barbata
- subsp. ingeae
- 'Prince River'

## Huernia bayeri

Kvete žlutými květy.

## Huernia blyderiverensis

## Huernia boleana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii. Dorůstá výšky 10cm. Stonky bývají vzpřímené (i poléhavé či převislé s délkou až 35cm), mají 5 žeber a šířku 1,2cm. Kvete na bázi rostliny na krátké stopce, koruna má průměr 2,5 - 3cm, vnější části jsou bělavé, korunní lístky na vnitřní straně, světle béžové s červenými skvrnami a pakorunka je tmavá až téměř černá.

Vyhovují ji kamenitá místa.

Množí se dělením nebo řízkem.

## Huernia calosticta

## Huernia clavigera

## Huernia collenetteae

## Huernia concinna

oblasti: Somálsko

Pochází ze Somálska. Kvete nažloutlými květy s tmavými hnědofialovými skvrnami a okrajovým lemem.

## Huernia distincta

## Huernia echidnopsioides

oblasti: Kapsko

Pochází z Kapska v Jihoafrické Republice. Jedná se o vyjímku co se týče stavby stonku. Nenajdete zde žebra, ale oválné výhony pokryté spirálovitými rýhami s dužnatými ostny. Stonek je dlouhý 6 - 8cm. Květy jsou zvonovité, nachově červené a pěticípé.

Je citlivá na vyšší zálivku. Rychle pak dochází k uhnívání kořenů. Výhony můžete přeroubovat na *Ceropegia woodii*, čímž se této nevýhody zbavíte.

## Huernia engleri

## Huernia erectiloba

## Huernia erinacea

## Huernia foetida

## Huernia formosa

## Huernia guttata

## Huernia haddaica

## Huernia hadhramautica

## Huernia hallii

oblasti: Namibie

Patří mezi endemity Namibie.

## Huernia hislopii

Kvete béžovými květy s červenými skvrnami a tmavým středem.

## Huernia humilis

## Huernia humpatana

## Huernia hystrix

oblasti: Keňa

Pochází z Keni. Stonky jsou 4 - 6ti žeborné, hojně odnožující v délce 5 - 10cm. Na vrcholech žebor vyrůstají dužnaté ostny. Květy mají tvar hodně oválného zvonu, který má v průměru 1,5 - 2cm. Barva je tmavě purpurová až fialová.

Má velkou náchylnost k přelití a uhnívání kořenů. Můžete to zkusit napravit zasypaním kořenů práškovým dřevěným uhlím, zaschnutím a poté zasazením do kaktusového substrátu.

## Huernia insigniflora

synonyma: H. confusa, H. zebrina subsp. insigniflora

Kvete nažloutlými květy se střední červenorůžovou jakoby nafouklou obručí.

### Huernia keniensis

oblasti: Keňa

### Huernia kennedyana

### Huernia khalidbinsultanii

### Huernia kirkii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Mosambik, V Afrika, Zimbabwe

Pochází z Mosambiku, jihovýchodního Zimbabwe a JAR.

### Huernia laevis

### Huernia lavrani

### Huernia leachii

### Huernia lenewtonii

### Huernia levyi

### Huernia lodarensis

### Huernia loeseneriana

### Huernia longii

### Huernia longituba

### Huernia lpanthera

## Huernia macrocarpa

oblasti: Etiopie, Jemen, Saudská Arábie, Somálsko

Pochází z Etiopie, Somálska, Saudské Arábie a Jemenu. Má asi 10cm stonky široké 1 - 2cm a mají 5 žeber. Na hřbetech žeber vyrůstají dužnaté ostny, někdy zbarvené trochu do hnědočervena. Květy jsou zvonovité, purpurové a mají tvar 10ticípé hvězdy, kde každý druhý vrchol je menší než sousední. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Schweinfurthii' - Saudská Arábie, Jemen

Množí se dělením trsů, přičemž vnitřní části trsu rychle odumírají.

## Huernia marnieriana

## Huernia mccoysi

oblasti: Jemen

Pochází z Jemenu. Kvete žlutými květy s tmavěfialovými skvrnami.

## Huernia namaquensis

## Huernia nigeriana

## Huernia nouhuysii

## Huernia occulta

## Huernia oculata

## Huernia pendula

oblasti: Východní Kapsko

Roste v JAR na skalách. Stonky jsou úzce válcovité, převislé až mírně vzpřímené, mírně 4žeberné, dlouhé do 15cm, široké 5 - 8mm a dokáží znovu zakořenit. Květy jsou krátce stopkaté, miskovité, vně růžovofialové, uvnitř až hnědé, průměru 2cm, pakorunka je tmavěhnědá a široká 3mm.

## Huernia pendulata

synonyma: H. pendula

Kvete tmavými červenofialovými květy.

## Huernia pendurata

## Huernia piersii

## Huernia pillansii

oblasti: Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR v trsech. Stonky jsou válcovité, drobně bradavičnaté do žebra či spirály a dlouhé až 18cm. Listy jsou nitkovité. Kvete červenými až červenohnědými květy o průměru 3 - 5cm se žlutými výběžky.

Vyžaduje dobře propustný suchý substrát.

Množí se odnožemi.

## Huernia plowesii

## Huernia plowseii

oblasti: Namibie

Patří mezi endemity Namibie. Kvete béžovými květy s fialovými skvrnami a středem.

## Huernia praestans

## Huernia primulina

## Huernia procumbens

oblasti: Severní Kapsko, Zimbabwe

Roste v JAR a Zimbabwe. Stonky jsou poléhavé až plazivé. Stonky jsou zelené, s červenou až červenofialovou kresbou, dlouhé do 30cm při šířce 1 - 1,5cm a mívají zpravidla 5 méně patrných žebor s tupými bradavkami (pouze na mladých částech). Palítky jsou dlouhé 3mm s vrcholem v podobě bílé špičky. Kvete zpravidla samostatnými květy o průměru 4cm, cípy se časem stáčejí ke stopce, jsou béžovobílé a prstenec má lesklou světlehnědou barvu.

Množí se stonkovými řízkami.

## Huernia pulchra

Huernia quinta

Huernia radhwana

Huernia recondita

Huernia reticulata

Huernia rosea

Huernia rubra

Huernia rubrosticta

Huernia saudi-arabica

oblasti: Saudská Arábie

Huernia schneiderana

oblasti: Malawi, Mosambik, V Afrika

Pochází z Malawi a Mosambiku. Stonky mají 5 - 7 žeber světle zelené barvy a dorůstají délky 10cm. Trny jsou měkké a dužnaté. Květy mají tvar zcela kulatého zvonu s okrajem prohnutým zpět. Barva květu je tmavě nachová, ve středu přechází až do hnědé. Množí se dělením trsu nebo odnožemi.

Huernia schneideriana

Huernia similis

Huernia somalica

Huernia stapelioides

Huernia stapeloides

oblasti: Namibie

Pochází z Namibie.

### Huernia striata

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Namibie

Pochází z jihozápadní Afriky. Kvete béžovými květy s tmavými hnědofialovými proužky až skvrnami.

### Huernia sudanensis

### Huernia thudichumii

### Huernia thureti

### Huernia thuretii

oblasti: Namibie, Východní Kapsko

Roste v JAR a Namibii v trsech. Stonek je šedozeleň, v mládí světlezeleň, dlouhý 4 - 5 (i 6)cm, široký 1 (i 2)cm, je tvořen ze 4 (ve stáří i 5 - 6ti) žeber s načervenalými výstupky a malým ostnem. Kvete světle žlutými až světle béžovými (vně zelenými až hnědozelenými) květy o průměru 2,5 - 3cm s hnědočervenými skvrnami na bázi nových výhonů na krátké stopce, jsou zvonovité, korunní lístky srostlé v 5cípou hvězdu s kulatými boky, uprostřed boků hvězdy jsou malé špičaté výstupky, jakési vrcholy druhé hvězdy vepsané v hlavní.

Množí se odnožemi.

### Huernia transmutata

### Huernia transvaalensis

oblasti: Transvaal

Roste v JAR.

### Huernia urceolata

### Huernia verekeri

### Huernia volkartii

### Huernia whitesloaneana



## Huernia witzenbergensis

## Huernia x pendurata

Zřejmě hybrid H. hystrix a H. keniensis nebo H. hystrix a H. pendula. Roste v trsech. Stonky jsou vystoupavé, 5tižebné, vysoké 10cm, široké 1cm a na hranách se špičatými bradavkami. Kvete na bázi mladších stonku, květy jsou vně zelenorůžové, uvnitř tmavě hnědočervené, v jícnu až prakticky černé a výrazně zapáchající.

Množí se dělením trsů nebo řízky.

## Huernia yemenensis

## Huernia zebrina

oblasti: Botswana, Jihoafrická Republika (JAR), Mosambik, Namibie, Zimbabwe

Roste v Namibie, Botswaně, Mosambiku, Zimbabwe a JAR v trsech. Dorůstá výšky 8cm. Stonky jsou vystoupavé, mají 4 - 5 žebér s dužnatými špičatými zuby délky 4 - 5mm, dlouhé (5 -) 6 - 8cm, široké 1,2 - 2cm. Kvete na 2 - 3cm stopce 1 - 3mi 5ticípými hvězdy o průměru 3,5 (i 5)cm, střed je červený a vypouklý a korunní lístky výrazně červeno bílé či světle žlutě pruhované (i celé hnědočervené). Plodem je měchýřek se 2ma pouzdry obsahující zploštělá hnědá semena s chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. magniflora/var. magniflora - Namibie, JAR; průměr květu až 8,5cm
- subsp. zebrina

Množí se odnožemi.

## Huerniadelicata

## Huerniatanganyikensis

<https://www.rostliny.net/>