

Viola odorata (Violka vonná)

synonyma: Viola lilacina, V. var. rotundata

čeleď: Violaceae

oblasti: Albánie, Alpy, Alžírsko, Andalusie, Anglie, Arizona, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Čína, Dánsko, Filipíny, Finsko, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Švédsko, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Karpaty, Katalánsko, Kavkaz, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Moldávie, Montana, Německo, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Zéland, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Pyreneje, Rakousko, Rhode Island, Rumunsko, S Balkánský poloostrov, S Řecko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, SZ Balkánský poloostrov, Švýcarsko, Tennessee, Tunisko, Ukrajina, Utah, V Balkánský poloostrov, Virginie, Wales, Washington, Wisconsin, Z Balkánský poloostrov, Z Rusko

Pochází z jižní Evropy, severní Afriky, Turecka a Kavkazu. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 8 - 10 (i 20)cm. Pod zemí vytváří více než 3cm dlouhé oddenky. Výběžky jsou kořenující, dlouhé 10 - 15cm. Nemá lodyhu. Vytváří přízemní růžici z ledvinovitých listů se špičkou, jsou mírně ochlupené a mají vroubkovaný okraj, délku 3 - 6cm, šířku 3,5 - 7,5cm a ochlupené (vzácně holé) řapíky. Vytváří také palisty široce vejčitého tvaru délky až 4mm. Kvete vonnými tmavými výrazně vonnými modrofialovými květy a kališní lístky jsou dlouhé 5 - 6mm. Plodem je tobolka délky 5 - 8mm a semena jsou dlouhá 2,5 - 2,8mm. Patří mezi staré léčivé rostliny. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - bílé květy
- 'Queen Charlotte' - modrofialové květy
- 'Royal Wedding' - husté trsy; rychlý růst; květy bílé, aromatické
- 'Rubra' - červené květy

Vyhovují ji sušší místa na okrajích cest, křovinách, lesích, s půdou bohatou na dusík, obvykle v blízkosti stavení.

Množí se semeny, které s oblibou rozšiřují mravenci anebo až 20cm dlouhými kořenujícími výběžky.

<https://www.rostliny.net/>