

Lithops aucampiae

čeleď: Aizoaceae

oblasti: Transvaal

Roste v JAR v 2 - 5tičetných trsech. Nemají na povrchu chlorofyl, takže asimilace probíhá jinak než u ostatních rostlin. Listy jsou oválné, mírně vyklenuté až ploché, hnědé až rezavé, kanálkovité (i s okénkem), dělené hlubokou brázdou, průměrem 3 - 5cm a s jemnými kresbami. Barva postranních částí je modrošedá. Kvete žlutými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aucampiae*
- var. *aucampiae*
- 'Betty's Beryl'
- 'Jackson's Jade'
- 'Storms's Snowcap'

- subsp. *eunicae*
- var. *eunicae*
- 'Bellaketty'
- 'Hikoruby'

- var. *fluminalis* - listy šedé
- 'Green River'

- var. *koelemanii* - listy bez kanálků, pouze s tmavými tečkami

<div>Zatímco kaktusy v zimě odpočívají, tento rod v zimě roste, i když ne povrchově. Když se koncem března, někdy i dříve, ve štěrbině mezi listy objeví nové tělíčko, začíná pro kaktusáře období zvýšení pozornosti. Nesmí zalévat, protože v té době se jako u většiny jiných podobných rodů přelévá živá hmota ze starých listů do nových, takže voda by je zahubila. Teprve když staré listy zmizí a jen zbytek jejich pokožky ještě chrání nové nevyzrálé listy před úžehem, můžeme vzít do ruky konvičku. V letním období mají klid a vodu dostávají jen po velmi dlouhých obdobích sucha, když vypadají unaveně. Napojit se tedy musí v době růstového klidu od května do října, aby si naplnily všechny mezibuněčný prostor pro budoucí růst.</div>

<https://www.rostliny.net/>