

Viola suavis (Violka křovištní)

synonyma: *Viola austriaca*, *Viola beraudii*, *Viola cyanea*, *Viola odorata* subsp. *cyanea*, *Viola odorata* subsp. *suavis*, *Viola pontica*, *Viola sepincola*

čeleď: Violaceae

oblasti: Altaj, Andalusie, Česká republika, Írán, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Malá Asie (Anatolie), Německo, Pamír, S Itálie, Švýcarsko, Ťan-šan

Pochází z jižní Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)cm. Pod zemí vytváří krátký tlustý oddenek. Výběžky bývají kořenující. Nevytváří lodyhu. Palisty jsou třásnité, obvykle brvité, občas s drobnými světlými žlázkami. Listy vytváří přízemní růžici, mají tupě špičatou špičku, délku 1,3 - 3 (i 4)cm, šířku 1,4 - 2,8 (i 4,5)cm, báze je srdčitou až široce okrouhlá a řapíky jsou řídce ochlupené. Kvete modrofialovými, v dolní 1/3 bílými vonnými květy na stopce s listenci v dolní 1/3, kališní lístky jsou dlouhé 5 - 8mm a ostruha je namodralá. Plodem je tobolka délky 6 - 8mm a semena jsou dlouhá 2 - 2,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *adriatica*
- subsp. *catalonica*
- subsp. *sepincola*
- subsp. *suavis* (Violka křovištní pravá)

<https://www.rostliny.net/>