

Microlepia (Šupinovka)

čeleď: Dennstaedtiaceae

Pochází z tropů Afriky a Asie. Dorůstá do výšky 0,5m. Vyznačuje se jemnými listy.

Vydrží na světle (ne přímém slunci) nebo v polostínu. Důležitá je vysoká vzdušná vlhkost a nevysychající půda (v létě bohatá zálivka). Jsou také náročné na výživu a proto je musíme každý týden hnosit.

Množí se výtrusy nebo dělením trsů.

Microlepia ampla

Microlepia angustipinna

Microlepia aspidioides

Microlepia attenuata

Microlepia calvescens

Microlepia caudifolia

Microlepia caudiformis

Microlepia caudipinnata

Microlepia chingii

Microlepia chrysocarpa

Microlepia communis

Microlepia crassa

Microlepia crenata

Microlepia crenatoserrata

Microlepia critica

Microlepia firma

Microlepia flaccida

Microlepia formosana

Microlepia fujianensis

Microlepia ganlanbaensis

Microlepia gigantea

Microlepia glabra

Microlepia hainanensis

Microlepia hancei

Microlepia herbacea

Microlepia hirsuta

Microlepia hirta

oblasti: JV Asie

Pochází z jižní Asie.

Microlepia hispida

Microlepia hookeriana

Microlepia intermedia

Microlepia jamaicensis

Microlepia japonica

Microlepia kansuensis

Microlepia khasiana

Microlepia kurzii

Microlepia kwangtungensis

Microlepia lofoushanensis

Microlepia longipilosa

Microlepia madagascariensis

Microlepia marginalis

Microlepia marginata (Mikrolepije okrajová)

Microlepia matthewii

Microlepia mauiensis

oblasti: Havajské ostrovy

Microlepia medogensis

Microlepia membranacea

Microlepia modesta

Microlepia mollifolia

Microlepia neostrigosa

Microlepia obtusiloba

Microlepia omeiensis

Microlepia pallida

Microlepia paucipinnata

Microlepia phanerophlebia

Microlepia pilosissima

Microlepia pingpienensis

Microlepia pinnata

Microlepia platyphylla (Šupinovka širolistá)

Microlepia polypodioides

Microlepia pseudostrigosa

Microlepia puberula

Microlepia scabra

Microlepia scyphoformis

Microlepia setosa (Mikrolepije osinatá)

oblasti: Indie, Srí Lanka

Roste v Indii a Srí Lance.

Microlepia singpienensis

Microlepia sinostrigosa

Microlepia speluncae (Šupinovka jeskynní)

oblasti: Havajské ostrovy

Pochází z tropických oblastí. Světlezelené 2 - 4x zpeřené listy jsou velice jemné. Dorůstají v přírodě délky až 2m. Listy mají trojúhelníkový tvar.

Potřebuje minimálně 60% vlhkost vzduchu. Proto je důležité pravidelné rosení a to dešťovou vodou. I substrát by měl být stále vlhký a propustný. Nikdy jej nenechte vyschnout. Navíc potřebuje velké množství živin. Ideální je používání hravského hnoje nebo v případě nouze rozpustným hnojivem. Minimální teplota (včetně zimy) je 15°C.

Microlepia straminea

Microlepia strigosa (Šupinovka hřebílečnatá)

oblasti: Havajské ostrovy

Je menšího vzrůstu. Listy jsou 2 - 3x zpeřené.

Microlepia subrhomboidea

Microlepia subspeluncae

Microlepia substrigosa

Microlepia subtrichosticha

Microlepia szechuanica

Microlepia taiwaniana

Microlepia tenella

Microlepia tenera

Microlepia trapeziformis

Microlepia trichocarpa

Microlepia trichoclada

Microlepia trichosora

Microlepia tripinnata

Microlepia villosa

Microlepia wentongensis

Microlepia x adulteriana

oblasti: Havajské ostrovy

Microlepia yunnanensis

Další informace:

<http://mechy-kapradiny.atlasrostlin.cz/supinovka>

http://rostliny.wz.cz/pages/kapradiny/vypis_stranky.php?id=8

<https://www.rostliny.net/>