

Pellaea (Kožitka)

čeleď: Pteridaceae

Pellaea andromedifolia

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pellaea atropurpurea (Kožitka nachověčervená)

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Guatemala, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v USA, Kanadě, Mexiku a Guatemale.

Vyhovují ji vápenitý substrát. Je odolná vůči mrazu.

Pellaea boivinii

oblasti: Afrika

Pochází z Afriky.

Pellaea brachyptera

oblasti: Kalifornie, Oregon, Washington

Pellaea breweri

oblasti: Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Pellaea bridgesii

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon

Pellaea caldirupium

oblasti: Austrálie, Nový Zéland

Pochází z oblasti Austrálie a Nového Zélandu.

Pellaea calomelanos

oblasti: Afrika, Katalánsko

Pochází z Afriky.

Pellaea cordifolia

oblasti: Texas

Pellaea cymbiformis

oblasti: Jižní Amerika

Pochází z Jižní Ameriky.

Pellaea dura (Kožitka Donianova)

oblasti: Madagaskar, Uganda, V Afrika, Z Afrika

Pochází z Afriky, Seychelských ostrovů a Madagaskaru.

Pellaea falcata (Kožitka srpatá)

oblasti: Indie, Malajsie, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Srí Lanka, Tasmánie

Pochází z oblasti Austrálie, Tasmánie, Indie, Srí Lanky, Malajsie, Nové Kaledonie a Nového Zélandu.

Množí se šlahouny.

Pellaea gastonyi

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Jižní Dakota, Missouri, Saskatchewan, Wyoming

Pellaea glabella

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Manitoba, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pellaea intermedia

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Pellaea lyngholmii

oblasti: Arizona

Pellaea mucronata

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Oregon

Pellaea ovata (Kožitka vejčitá)

oblasti: Argentina, Střední Amerika, Texas

Roste ve střední a jižní Americe.

Pellaea rotundifolia (Kožitka okrouhlolistá)

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu. Vytváří kulaté kožovitě vyhlížející listy díky nimž není tak náročná na vlhko jako jiné kapradiny.

Vyhovují ji skalní štěrby. Nemá zvláštní nároky na substrát, stačí ji i směs listovky a písku. Přestože nároky na vlhko nejsou tak vysoké, substrát by neměl nikdy zcela vyschnout a zároveň pozor na přemáčení. Vyhovuje ji světlé místo chráněné před přímým sluncem nebo polostí. Teplota nesmí nikdy klesnout pod 10°C. Hnojíme jednou za 14 dní tekutými hnojivy.

Množí se výtrusy nebo dělením trsů.

Pellaea sagittata

Pellaea ternifolia (Kožitka trojlistá)

oblasti: Argentina, Arizona, Havajské ostrovy, Karibik, Mexiko, Texas

Roste v USA, Mexiku, Karibiku, dále až v Argentině a na Havajských ostrovech.

Pellaea truncata

Pellaea viridis (Kožitka zelená)

oblasti: Havajské ostrovy, Madagaskar, Makaronésie, Nový Zéland, S Austrálie, Sokotra, Tropická Afrika

Pochází z tropické a subtropické Afriky, Seychelských ostrovů, Sokotry, Kapverdských ostrovů,

zavlečená byla na Havaj, Nový Zéland a Austrálie.

Pellaea wrightiana

oblasti: Arizona, Jižní Karolína, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Severní Karolína, Texas, Utah

Pellaea x glaciogena

oblasti: Kalifornie

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/temnotka-pellaea-rotundifolia/>

<https://www.rostliny.net/>