

Stromanthe

čeleď: Marantaceae

Obvykle dorůstají výšky do 70cm.

Jako jiné rostliny z čeledi marantovitých, i tato potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost, propustný mírně vlhký substrát, pokojovou teplotu a rosení.

Stromanthe angustifolia

Stromanthe boliviana

oblasti: Bolívie

Stromanthe confusa

Stromanthe glabra

Stromanthe guapilesensis

Stromanthe hjalmarssonii

Stromanthe jacquinii

Stromanthe macrochlamys

Stromanthe palustris

Stromanthe papillosa

Stromanthe pluriflora

Stromanthe popolucana

Stromanthe portiana

Stromanthe ramosissima

Stromanthe sanguinea

oblasti: Brazílie, Střední Amerika

Pochází ze střední a Jižní Ameriky. Stonek a spodní strana listu má červenou barvu. Listy dosahují délka 30 - 50cm a šířky 10cm. Listy mají tmavě zelenou barvu se světlým pruhem uprostřed. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Stripe Star' - výraznější střední světlý pruh
- 'Triostar' - list v barevné kombinaci béžové, tmavě a světle zelené

Vzhledem k tomu, že roste na krajích lesa, snáší i ranní přímé slunce. Ale po zbytek dne by mělo být pouze rozptýlené. Vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost a tak je žádoucí pravidelné rosení. Používáme propustný substrát bohatý na živiny. Udržíme jej stále mírně vlhký. Minimální teplota pěstování je 10°C, ideální je pokojová teplota a maximální 25 - 30°C. Hnojí se jednou za 14 dní tekutými hnojivy pro pokojové rostliny.

Množí se dělením kořenů.

Stromanthe schottiana

Stromanthe sellowiana

Stromanthe stromanthoides

Stromanthe thalia

Stromanthe tonckat

Další informace:

http://rostliny.wz.cz/pages/zelene/vypis_stranky.php?id=89

<http://www.celysvet.cz/stromanthe.php>

<https://www.rostliny.net/>