

Syngonium

čeleď: Araceae

Roste od Mexika po Bolívii v podobě liány. Zprvu koření v zemi, později se stávají epifytem a vytváří příčepivé kořeny. Vytváří šípovité listy o délce 7 - 13cm. Kvete toulcovými květy. Vzhledem listů se podobá filodendronu. Nejznámějším druhem je *S. angustatum*. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Hungarian White'
- 'Maya Red'

Ideální teplota pěstování je pokojová teplota, přesně mezi 20 - 30°C. Minimální teplota by nikdy neměla klesnout pod 16 - 18°C. Potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost, rozptýlené světlo a stále vlhký substrát (před zálivkou ale může i mírně proschnout). Hnojíme jednou za 14 dní tekutými hnojivy pro pokojové rostliny. Přesazuje se každý druhý rok.

Množí se stonkovými řízků.

Syngonium angustatum

oblasti: Florida

Listy mají v mládí podél žilek stříbrobílou kresbu, dospělé exempláře mají listy znožené s méně výraznou kresbou, dlouhé až 40cm a tvoří je až 11 lístků.

Syngonium angustifolium

Syngonium armigerum

Syngonium atrovirens

Syngonium auritum

oblasti: Portoriko

Výhony jsou mohutnější. Listy jsou 3 - 4dílné a centrální úkrojek je největší.

Syngonium chiapense

Syngonium chocoanum

Syngonium crassifolium

Syngonium dodsonianum

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru ze subtropických a tropických deštných lesů.

Syngonium erythrophyllum

Syngonium foreroanum

Syngonium gentryanum

Syngonium glaucopetiolatum

Syngonium harlingianum

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru ze subtropických a tropických deštných horských lesů.

Syngonium hastiferum

Syngonium hastifolium

Syngonium hoffmannii

Syngonium laterinervium

Syngonium llanoense

Syngonium macrophyllum

Syngonium mauroanum

Syngonium meridense

Syngonium neglectum

Syngonium oduberi

Syngonium podophyllum

oblasti: Florida, Kostarika, Panama, Portoriko

Roste v Panamě a Kostarice. Může s opěrou růst do výšky nebo být převislá anebo výhony můžete nechat růst do šířky délky až 2m. Listy jsou různě tvarované, 5 - 9tidílné, střelovité, špičaté, tmavě zelené a lesklé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albolineatum' - listy s výraznou žilnatinou a béžově bílou kresbou
- 'Aureum' - listy s výraznou žilnatinou a žlutě zelenou kresbou
- 'Brocante' - listy až červené
- 'Emerald Gem' - šípovité masité listy
- 'Emerald Gem Variegated' - bíle skvrnité listy
- 'Imperial White' - listy bílé
- 'Lime' - listy s výraznou žilnatinou a žlutě zelenou kresbou
- 'Maya Red' - listy až růžové
- 'Pink' - listy až růžové
- 'Trileaf Wonder' - listy s výraznou žilnatinou a béžově bílou kresbou
- 'White Butterfly' - listy s výraznou žilnatinou a béžově bílou kresbou

Syngonium salvadorensense

Syngonium schottianum

Syngonium sparreorum

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru ze subtropických a tropických deštných horských lesů.

Syngonium standleyanum

Syngonium steyermarkii

Syngonium triphyllum

Syngonium wendlandii

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice.

Syngonium yurimaguense

Další informace:

<http://cajovnaprozeny.blog.cz/0811/syngonium-vdecna-krasavice>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/syngonium/>

http://rostliny.wz.cz/pages/zelene/vypis_stranky.php?id=90

<http://www.celysvet.cz/syngonium.php>

<http://www.chovatelka.cz/pokojove-rostliny-clanek/syngonium-charakteristika-a-zakladni-rady-pro-pest-42/>

<https://www.rostliny.net/>