

## Thunbergia (Thunbergie)

čeleď: Acanthaceae

Pochází z tropických oblastí Afriky, Madagaskaru a jižní Asie. Najdeme mezi nimi jednoletky i trvalky. Dorůstají délky 2 - 8m. Listy jsou střídavé oválného tvaru se špičatým zakončením. Kvete trubkovými květy s širokým koncovým lemem. Plodem je tobolka.

Vyhovuje ji dobře propustná půda bohatá na živiny a vysoká zálivka. Pro svůj růst vyžadují opěru v podobě žebříku, tyče, atp., podél které by se mohla ovíjet. Na jaře se provádí seříznutí asi na 30cm.

Množí se semeny, některé i koncovými stonkovými řízky (zakořeňují se v teple a s vysokou vzdušnou vlhkostí).

### Thunbergia adenocalyx

#### Thunbergia affinis

##### Thunbergia alata (Thunbergie křídlatá)

synonyma: Endomelas alata

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, J Afrika, Portoriko, Texas, Tropická Afrika

Pochází z jižní a tropické Afriky. Dorůstá výšky 1,8 - 2,4m ve svém přirozeném prostředí nebo při vysazení do volné půdy. U nás se zřejmě dočkáte výšky kolem 1m při výsadbě do hrnků na balkon atp. Kvete oranžovými květy s černým středem. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. alba - bílé květy
- var. albiflora
- var. aurantiaca
- var. bakeri
- subvar. doddsii
- 'Lemon Star' - květy světležluté, střed hnědý
- var. lutea
- var. reticulata
- var. retinervia
- var. sulphurea
- 'Sunny Suzy' - květy žlutooranžové, střed hnědý
- 'Sunny Suzy Brown' - květy červené, střed hnědý
- 'Sunrise Wnite' - květy bílé, střed hnědý
- var. vixalata

Teplota by neměla klesnout pod 10°C. Vyhovuje ji větší zálivka a světlé místo s ochranou proti přímému polednímu slunci. Dobře snáší větrná místa.

Množí se semeny nebo řízky.

### Thunbergia alba

Thunbergia amoena

Thunbergia anatina

Thunbergia angolensis

Thunbergia angulata

Thunbergia annua

Thunbergia armipotens

Thunbergia atacorensis

Thunbergia atriplicifolia

synonyma: *T. aspera*, *T. bachmannii*, *T. cordibracteolata*, *T. galpinii*, *T. hirtistyla*, *T. xanthotricha*

Thunbergia aurea

Thunbergia battiscombei

Thunbergia beniensis

Thunbergia beninensioides

Thunbergia bikimaensis

Thunbergia bogoroensis

Thunbergia brewerioides

Thunbergia capensis

Thunbergia cerinthoides

## Thunbergia chrysops

## Thunbergia ciliata

## Thunbergia coccinea

synonyma: Hexacentris coccinea

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Lutea'

## Thunbergia convolvulifolia

synonyma: T. humbertii

## Thunbergia cordata

## Thunbergia crispa

## Thunbergia cuanzensis

## Thunbergia cyanea

synonyma: T. hispida, T. solmsiana

## Thunbergia cycnium

## Thunbergia cynanchifolia

## Thunbergia dasychlamys

## Thunbergia dregeana

## Thunbergia eberhardtii

## Thunbergia erecta (Thunbergie vzpřímená)

synonyma: Meyenia erecta

oblasti: Florida, Portoriko, Z Afrika

Pochází ze západní Afriky. Patří mezi trvalky. Na jaře se provádí seříznutí. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Alba'

Zimuje při teplotě 15°C na světle s omezením zálivky. Dobře snáší řez.

Množí se semeny.

### Thunbergia fasciculata

### Thunbergia fischeri

#### Thunbergia fragrans (Thunbergie vonná)

synonyma: Roxburghia rostrata, T. volubilis

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Portoriko

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Angel Wings'

### Thunbergia gentianoides

### Thunbergia gibsonii

### Thunbergia gossweileri

### Thunbergia gracilis

### Thunbergia graminifolia

#### Thunbergia grandiflora (Thunbergie velkokvětá)

synonyma: Flemingia grandiflora, Pleuremidis grandiflora, T. adenophora, T. chinensis, T. cordifolia, T. lacei

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Indie, Myanmar (Barma), Portoriko, Srí Lanka, Střední Asie

Pochází z Indie, Myanmu a Srí Lanky. Délka ovýjivých stonků může dosáhnout i 30m. Vstřícně vyrůstající listy mají vejčitý tvar se špičkou, pilový okraj, délku 7 - 20cm, šířku 3 - 18cm. Kvete modrofialovými květy se žlutým kalichem o velikosti až 8cm v paždí listů v až 2m hroznech. Plody

jsou kulaté s až 2cm zobanem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Alba' - bílé květy

Vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost, hodně tepla a světla bez přímého slunečního záření a plnou zálivku. Teplota by neměla klesnout pod 20°C, v zimě může klesnout až na 10 - 13°C, ale lepší je zůstat nad 20°C.

Množí se z jara vrcholovými řízky zakořeňujícími v teplotě kolem 25°C.

### Thunbergia gregorii

Přestože patří k trvalkám, v našich podmínkách se pěstuje spíše jako jednoletka. Kvete oranžovými květy.

Vyhovuje ji plná zálivka a hodně světla bez přímého poledního sluníčka. Pokud se rozhodnete o zimování, bude potřeba rostlině doprát teplotu v rozmezí 12 - 16°C, dostatek světla a slabou zálivku.

Množí se semeny.

### Thunbergia guerkeana

### Thunbergia hamata

### Thunbergia heterochondros

### Thunbergia hockii

### Thunbergia holstii

### Thunbergia hookeriana

### Thunbergia huillensis

### Thunbergia hyalina

### Thunbergia katentaniensis

### Thunbergia kirkiana

## Thunbergia laborans

## Thunbergia laevis

## Thunbergia lamellata

## Thunbergia lancifolia

synonyma: T. lancifolia var. auriculata, T. lancifolia var. laevis, T. lancifolia var. pallida

## Thunbergia lathyroides

## Thunbergia laurifolia (Thunbergie vavřínolistá)

synonyma: T. grandiflora var. laurifolia

oblasti: Havajské ostrovy, JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie.

Vyhovují ji teploty min. 20°C.

## Thunbergia leucorrhiza

## Thunbergia liebrechtsiana

## Thunbergia longepedunculata

## Thunbergia longifolia

## Thunbergia longisepala

## Thunbergia lutea

synonyma: T. salweenensis

## Thunbergia malangana

## Thunbergia masisiensis

## Thunbergia mechowii

## Thunbergia mellinocaulis

## Thunbergia microchlamys

## Thunbergia mildbraediana

## Thunbergia mollis

## Thunbergia monroi

## Thunbergia mysorensis (Thunbergie mysorská)

synonyma: Hexacentris mysorensis

oblasti: J Indie

Roste v Indii jako liána. Dorůstá výšky 6 - 10m. Listy jsou vstřícné, dlouze eliptické, dlouhé 7 - 15cm a široké 2,5 - 9cm. Kvete ve svislých až 90cm hroznech kalichovými květy otočenými směrem vzhůru s jednou prodlouženou stranou, jejich celková délka může být až 6cm a šířka 4cm. Plody jsou zakulacené, velké asi 1cm s 2cm zobanem.

Teplota nesmí klesnout k 10°C.

## Thunbergia natalensis (Thunbergie natalská)

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Zimuje při teplotě 15°C na světle s omezením zálivky. Dobře snáší řez.

## Thunbergia neglecta

## Thunbergia oblongifolia

## Thunbergia oubangiensis

## Thunbergia parvifolia

## Thunbergia paulitschkeana

synonyma: T. elliotii

Thunbergia petersiana

Thunbergia pondoensis

Thunbergia purpurata

Thunbergia pynaertii

Thunbergia recasa

Thunbergia retifolia

Thunbergia rufescens

Thunbergia schimbensis

Thunbergia schweinfurthii

Thunbergia sericea

Thunbergia sessilis

Thunbergia stellarioides

Thunbergia stelligera

Thunbergia stuhlmanniana

Thunbergia subalata

Thunbergia togoensis (Thunbergie tožská)

oblasti: Togo

Roste v tropické Africe. Kvete fialovými květy.

[Thunbergia usambarica](#)

[Thunbergia valida](#)

[Thunbergia venosa](#)

[Thunbergia vogeliana](#)

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K346.php>

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/thunbergie-thunbergia/>

<http://www.garten.cz/e/cz/1023-thunbergie-kridlata-thunbergia-alata/>

<http://www.pelargonie.cz/Thunbergie.html>

<https://www.rostliny.net/>