

Capsicum annum (Paprika setá)

synonyma: Capsicum abyssinicum, Capsicum angulosum, C. f. chlorocarpum, C. f. erectum, C. f. leucocarpum, C. f. luteum, C. f. nigrum, C. f. pendulum, C. f. violaceum, C. subsp. microcarpon, C. var. abbreviata, C. var. abbreviatum, C. var. acuminatum, C. var. aviculare, C. var. conicum, C. var. conoides, C. var. cordiforme, C. var. fasciculatum, C. var. frutescens, C. var. globiferum, C. var. grossum, C. var. longum, C. var. minimum, C. var. minus, C. var. oblongoconicum, C. var. parvoacuminatum, Capsicum axi, Capsicum bauhinii, Capsicum caerulescens, Capsicum cerasiforme, Capsicum ceratocarpum, Capsicum cereolum, Capsicum comarim, Capsicum conicum, Capsicum conoide, Capsicum conoides, Capsicum conoideum, Capsicum conoideum var. chordale, Capsicum conoideum var. oblongoconicum, Capsicum conoideum var. sulcatum, Capsicum cordiforme, Capsicum crispum, Capsicum cydoniforme, Capsicum dulce, Capsicum fasciculatum, Capsicum fastigiatum, Capsicum frutescens, Capsicum frutescens var. cerasiforme, Capsicum frutescens var. conoides, Capsicum frutescens var. fasciculatum, Capsicum frutescens var. frutescens, Capsicum frutescens var. glabriusculum, Capsicum frutescens var. grossum, Capsicum frutescens var. lanicaule, Capsicum frutescens var. longum, Capsicum frutescens var. minus, Capsicum frutescens var. queenslandicum, Capsicum globiferum, Capsicum globosum, Capsicum grossum, Capsicum indicum, Capsicum indicum subsp. elaeocarpon, Capsicum indicum var. aviculare, Capsicum indicum var. conoideum, Capsicum indicum var. ribesium, Capsicum longum, Capsicum milleri, Capsicum minimum, Capsicum odoratum, Capsicum odoriferum, Capsicum oliviforme, Capsicum ovatum, Capsicum petenense, Capsicum pomiferum, Capsicum purpureum, Capsicum pyramidale, Capsicum quitense, Capsicum silvestre, Capsicum sphaerium, Capsicum tetragonum, Capsicum tomatiforme, Capsicum torulosum, Capsicum tournefortii, Capsicum ustulatum

čeleď: Solanaceae

oblasti: Alabama, Arizona, Connecticut, Česká republika, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Maryland, Mississippi, New York, Nové Mexiko, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Texas, Virginie

Pochází z tropické Ameriky. Patří mezi jednoletky nebo krátkověké keře. Dorůstá výšky 0,3 - 0,8 (i 1,8)m. Kromě užitných forem pro zemědělství se vytvořily i formy okrasné (obvykle o výšce 30 - 35cm). V přírodě dorůstá výšky až 1,5m. Střídavé listy mají vejčitý tvar, délku 1,5 - 12cm a šířku 0,5 - 7,5cm. Kvete v paždí listů bílými květy s 5tičetnou kolovitou korunou o průměru 0,5 - 1,1cm, okvětní lístky mají špičatý konec a střed je žlutozelený. Plody nabývají barev zelené, červené, oranžové a žluté. Čili paprika je pouze kultivarem tohoto druhu. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. angulosum
- convar. annum - původní přírodní druh; plody špičaté s různě ostrou chutí
- var. cerasi piperatum (Paprika roční zeleninová pálivá)
- 'Korál'
- 'Large Red Hot'
- 'Large Sweet Cherry'

- provar. cerasiforme - plody malé, kulovité
- var. conoides fosciculatum (Paprika roční kořeninová pálivá/Feferonka) - plody jehlancovité, dlouhé 7cm, zpravidla hroznovité
- 'Hodonínská ostrá'
- 'Maďarská pálivá'
- 'Poznaňská pálivá'
- 'Segedinská ostrá hrubostěnná'

- var. frutescens (Paprika roční zeleninová sladká) - sladká, plody dlouhé 5cm, široké 7cm, tlustější se označují jako ovocné/rajčatové, jako kapie se označují protáhlé plody o délce 13cm a šířce 6 - 7cm
- Andrea'
- 'Česká raná'
- 'Eva'
- 'Hodonínská zelená'
- 'Jova'
- 'Moravská ovocná'

- 'Fushimiama'
- convar. grossum - plody kuželovité nebo jehlanovité, podélně rýhované, mírně ostré
- convar. longum/var. longum (Paprika roční kořeninová sladká) - plody sladké, dlouhé 10 - 12cm, široké 1 - 2cm
- 'Betka'
- 'Dunajská' - tlusté stěny plodů
- 'Hodonínská sladká vzpřímená'
- 'Hurbanovská' - tenké stěny plodů
- 'Karkulka'
- 'Karmína'
- 'Nitranská' - tenké stěny plodů
- 'Trnavská' - tlusté stěny plodů
- 'Povážská' - tlusté stěny plodů
- 'Red Missile' - plody zprvu bílé, později fialové až červené

- 'Habanero'
- 'Madame Jeanette'

Potřebuje hodně tepla a přímého slunce. Půda by měla být lehká, písčité, bohatá na živiny a zálivka vydatná.

Množí se semeny vysévanými při teplotě 20°C.

<https://www.rostliny.net/>