

Astrophytum myriostigma (Astrofytum mnohoblízné)

synonyma: *Astrophytum coahuilense*, *Astrophytum columnare*, *Astrophytum depressum*, *A. subsp. coahuilense*, *A. subsp. glabrum*, *A. subsp. potosinum*, *A. subsp. quadricostatum*, *A. subsp. tamaulipense*, *A. subsp. tulense*, *A. var. cereiforme*, *A. var. coahuilense*, *A. var. columnare*, *A. var. grandiflorum*, *A. var. minimiflorum*, *A. var. nudicarpa*, *A. var. nudum*, *A. var. potosinum*, *A. var. quadricostatum*, *A. var. strongylogonum*, *A. var. tamaulipense*, *A. var. tulense*, *A. var. verum*, *Astrophytum nuda*, *Astrophytum prismaticum*, *Astrophytum quadratum*, *Astrophytum tulense*, *Cereus colicochus*, *Echinocactus myriostigma*, *Echinocactus myriostigma f. columnaris*, *Echinocactus myriostigma subsp. coahuilensis*, *Echinocactus myriostigma subsp. potosinus*, *Echinocactus myriostigma subsp. quadricostatus*, *Echinocactus myriostigma var. coahuilensis*, *Echinocactus myriostigma var. columnaris*, *Echinocactus myriostigma var. nuda*, *Echinocactus myriostigma var. nudus*, *Echinocactus myriostigma var. quadricostatus*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Coahuila, Durango, San Luis Potosí

Roste v Mexiku. Druhové jméno je odvozeno od řeckého *myrio* (mnoho) a *stigma* (body, znaménka), což znázorňuje rostlinu posetou mnoha vločkami. Dorůstá výšky 0,3 - 0,7 (i 1)m a průměru (10-) 15 - 20 (i 25)cm. Stonek rostliny je v mládí kulatý, tmavě zelený, bez trnný, má (4-) 5 - 6 (i 8) žeber a je bíle šupinatý. Kvete žlutými široce nálevkovitými květy s červeným o průměru 5 - 7cm, a jsou cizosprašné. Plodem je pukavá červeně růžově fialová tobolka obsahující hnědé přilbovité semeno délky 2mm. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. *columnaris*/var. *columnare*
- var. *multicostatus*/var. *multicostatum*
- var. *nudum* - holý, bez vloček na povrchu rostliny
- var. *potosinum*
- var. *quadricostatum* - pouze 4 mělká žebra
- var. *strongylogonum*
- var. *tamaulipense*
- var. *tricostatum*
- var. *tulense*
- var. *viescaensis*

V přírodě roste na náhorních plošinách celého Mexika a dle jednotlivých lokalit se odvíjí i spousta variet. Pěstujeme v propustném substrátu, nejlépe s obsahem vápníku. Zimovat bez vody s teplotou nad 8 - 10°C. Zálivku potřebuje pouze malou bez příměsi organických látok. V létě je samozřejmostí doprát rostlině plné slunce.

Množí se semeny. Snadno a rychle klíčící.