

Arisarum (Árónovec)

čeleď: Araceae

Roste ve středozeří s přesahem na ostrovy v Atlantickém oceánu jako trvalka. Výška dosahuje asi 10cm. Pod zemí vytváří vejčité hlízy až podlouhlý oddenek. Vytváří pouze 1 - 3 listy srdčitého nebo střelovitého tvaru s dlouhými řapíky. Kvete drobnými květy na palici skryté v toulci, celková délka květenství může dosáhnout i 15cm. Pěstuje se zejména kvůli plodům, které mají tvar ohnutého visícího vaku.

Vyhovuje mu polostín a propustná kamenitá mírně vlhká dobře propustná půda bohatá na živiny. Vyskytuje se ve skalních puklinách nebo kamenitých půdách. Je mrazuvzdorný. U nás je možné pěstovat pouze A. proboscideum.

Množí se semeny nebo dělením oddenků sazenými do hloubky 5cm.

Arisarum proboscideum

oblasti: Andalusie, J Itálie, Střední Itálie

Roste v Itálii a Španělsku jednotlivě, vzácněji po 2 - 3ks. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 40)cm. Pod zemí vytváří podlouhlý oddenek. Stonek je krátký, bývá i kratší než řapík listů. Listy jsou tmavězelené, střelovité, řapík je dlouhý a zpravidla fialově skvrnitý. Květenství je krátce stopkaté, hnědé, tvořené toulcem a palicí, toulec je na bázi světlý, zbytek pak sivozelený až růžovofialový zakončený dlouhou vzpřímenou hnědou bičovitou špičkou délky 15cm, ve spodní části palice je 1 - 6 samičích květů a zbývající jsou samčí. Plody jsou zelené, připomínají nafouklé vaky bílohnědé barvy.

Hodí se jako půdokryvná rostlina do mírně vlhké půdy v polostínu.

Arisarum simorrhinum

oblasti: Andalusie, Makaronésie, Maroko, Portugalsko

Roste v Portugalsku, Španělsku, Maroku a Kanárských ostrovech. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 40)cm. Pod zemí vytváří kulovitou hlízu. Listy jsou srdčité až střelovité. Květenství je krátce stopkaté, toulec má světlou nazelenalou bázi s růžovofialovými proužky, zbytek je pak celý růžovofialový a hákovitě zahnutá palice z něj vyčnívá.

Arisarum vulgare (Árónovec obecný)

oblasti: Andalusie, Baleáry, Egypt, Itálie, Izrael, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste ve středozeří, Azorech, Kanárských ostrovech a Balkánském poloostrově jako trvalka. Dorůstá výšky (15 -) 20 - 40 (i 50)cm. Pod zemí vytváří menší vejčitou hlízu. Listy jsou srdčité až střelovité, tupě zaoblené, lesklé, dlouze řapíkaté a dlouhé 4 - 15cm. Květenství má načervenalou skvrnitou stopku, tvoří jej 3 - 5cm dlouhý světlezelený až hnědočervený kápovitý toulec s tmavšími zelenými nebo růžovofialovými pruhy až tečkami, palice je hákovitá, vyčnívá z toulce, na bázi má několik samičích květů a ostatní jsou samčí. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *clusii*
- subsp. *hastatum*
- subsp. *simorrhinum*
- subsp. *vulgare* (Árónovec obecný pravý)

<https://www.rostliny.net/>