

Stewartia (Stewartie)

čeleď: Theaceae

Rodové jméno bylo pojmenováno na počest amatérského botanika Johna Stuarta, hraběte z Bute (1713 - 1792). Roste ve východní Asii, pouze 2 jsou z jihovýchodu Severní Ameriky (*S. malacodendron* a *S. ovata* - keře o výšce 3 - 5m) v podobě keře nebo stromu o výšce 3 - 20m a většinou jsou opadavé (např. *S. pteropetiolata* je ale stálezeleným druhem). Listy jsou střídavé, jednoduché, dlouhé 3 - 14cm. Květy mají v průměru 3 - 11cm s 5ti okvětními lístky (zřídka 6 - 8). Plodem je suchá tobolka s 5ti částmi a v každé části se nachází 4 semena.

Množí se polovyzrálými řízkami nebo semeny (se stratifikací 3 - 5 měsíců teplo, 3 chladno).

Stewartia calicicola

Stewartia cordifolia

Stewartia crassifolia

Stewartia densivillosa

Stewartia gemmata

Stewartia koreana

oblasti: Korea

Stewartia laotica

Stewartia malacodendron

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas, Virginie

Pochází z jihovýchodu USA. Dorůstá výšky 3 - 4,5 (i 9)m. Listy vyrůstají střídavě, mají tmavě zelenou barvu a délku 5 - 10cm. Bílé květy s červenými pestíky mají v průměru 6 - 9cm. Plod obsahuje 4 - 5 komůrek po 2 - 4 semenech.

Stewartia medogensis

Stewartia micrantha

Stewartia monadelphpha (Stewartie jednobratrá)

oblasti: Japonsko, Korea

Roste v Japonsku a Koreji. Květy mají průměr 2,5 - 4cm.

Stewartia obovata

Stewartia ovata (Stewartie vejčitá)

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Mississippi, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Roste v USA v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 3 - 5m. Listy jsou vejčité, na podzim oranžové, červené nebo žluté, dlouhé 7 - 13cm a široké 3 - 6cm. Květy mají průměr 6 - 8 (i 12)cm a korunní lístky jsou bílé. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. ovata - průměr květu 6 - 8cm

- var. grandiflora - průměr květu až 12cm

Stewartia pseudocamellia (Stewartie kaméliovitá)

oblasti: Honšú, J Korea, Šikoku

Roste v Japonsku a Koreji v podobě opadavého vzpřímeného až široce rozkladitého, kuželovitého, později široce sloupovitého keře (i stromu). Dorůstá výšky (5 -) 10 - 15 (i 18)m a šířky do 10m. Borka je červeně hnědá a odlupuje se v plátech. Listy jsou střídavé, vejčité až obvejčité, krátce špičaté, jemně pilovité, lesklé, tmavě zelené, na podzim žluté, oranžové nebo červené, dlouhé 4 - 10 (i 12)cm, široké 2,5 - 5cm, báze klínovitá a spodní strana může být ochlupená a řapík krátký. Bohatě kvete samostatnými (i párovými) narůžovělými 5tičetnými květy o průměru 5 - 6 (i 8)cm. Z rostliny opadávají v neporušeném stavu. Plodem je červeně hnědá dřevnatá tobolka délky 2 - 2,5cm, puká v 5ti chlopních a obsahují tmavá zploštělá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. japonica

- var. koreana - menší; listy dlouhé 2 - 12cm, širší, na bázi široce klínovité až kulaté; květy široké až 8cm

- 'Minterne'

Potřebuje vlhké kyselé dobře propustné půdy bohaté na živiny, teplo, slunce a chráněné místo s vyšší vzdušnou vlhkostí.

Množí se semeny nebo hřížením.

Stewartia pteropetiolata

Stewartia rostrata

Stewartia rubiginosa

Stewartia serrata (Stewartie pilovitá)

Stewartia sichuanensis

Stewartia sinensis (Stewartie čínská)

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

Stewartia sinii

Stewartia villosa

Stranvaesia davidiana (Stranvésie Davidova)

Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Lutea' - žluté plody
- 'Fructu Luteo'
- 'Palette'

Další informace:

http://dendroz.dendrologie.cz/html_stranky/Stewartia.htm

<http://www.about-garden.com/a/en/3043-stewartia-pseudocamellia-var.koreana-korean-stewartia-false-camellia/>

<https://www.rostliny.net/>