

Aquilegia vulgaris (Orlíček obecný)

synonyma: *Aquilegia aggericola*, *Aquilegia arbascensis*, *Aquilegia bertolonii* var. *parviflora*, *Aquilegia collina*, *Aquilegia corniculata*, *Aquilegia cyclophylla*, *Aquilegia dumeticola*, *Aquilegia ebneri*, *Aquilegia eynensis*, *Aquilegia glaucescens*, *Aquilegia glaucophylla*, *Aquilegia hispanica*, *Aquilegia inversa*, *Aquilegia longisepala*, *Aquilegia mollis*, *Aquilegia nemoralis*, *Aquilegia nigricans* var. *ebneri*, *Aquilegia nivea*, *Aquilegia ochroleuca*, *Aquilegia platysepala*, *Aquilegia praecox*, *Aquilegia recticornu*, *Aquilegia ruscinonensis*, *Aquilegia silvestris*, *Aquilegia speciosa*, *Aquilegia stellata*, *Aquilegia subalpina*, *Aquilegia versicolor*, A. f. *aggericola*, A. f. *arbascensis*, A. f. *collina*, A. f. *cornuta*, A. f. *cyclophylla*, A. f. *dumeticola*, A. f. *mollis*, A. f. *nemoralis*, A. f. *praecox*, A. f. *ruscinonensis*, A. f. *subalpina*, A. subsp. *ballii*, A. subsp. *hispanica*, A. var. *aggericola*, A. var. *albiflora*, A. var. *arbascensis*, A. var. *ballii*, A. var. *collina*, A. var. *corniculata*, A. var. *cyclophylla*, A. var. *dumeticola*, A. var. *ebneri*, A. var. *elegans*, A. var. *eynensis*, A. var. *glabella*, A. var. *glabra*, A. var. *glandulosopilosa*, A. var. *grandiflora*, A. var. *hispanica*, A. var. *huteri*, A. var. *incisa*, A. var. *longisepala*, A. var. *mollis*, A. var. *nemoralis*, A. var. *nivea*, A. var. *notabilis*, A. var. *ochroleuca*, A. var. *parviflora*, A. var. *platysepala*, A. var. *praecox*, A. var. *pratensis*, A. var. *pseudoatrata*, A. var. *rifiensis*, A. var. *ruscinonensis*, A. var. *sicula*, A. var. *sooi*, A. var. *stellata*, A. var. *subalpina*, A. var. *subtomentosa*, A. var. *silvestris*, A. var. *varia*, *Aquilegia winterbottomiana*, *Aquilina vulgaris*

čeleď: Ranunculaceae

oblasti: Connecticut, Česká republika, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kentucky, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Sierra Nevada (Španělsko), Švýcarsko, Vermont, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Pochází z Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 0,9 (i 1,2)m a šířky i více než 45cm. Listy jsou 2x 3četné, vroubkované a šedo zelené. Kvete modrofialovými, růžovými nebo i bílými nálevkovitými květy s krátkou ostruhou. Spodní ostruha je háčkovitě prohnutá. Plodem je měchýřek. Patří mezi chráněné druhy C3. Je jedovatý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *hispanica*
- subsp. *nevadensis*
- 'Nivea' - květy bílé
- 'Nora Barlow' - květy plnokvěté, kališní lístky úzké, nazelenalé, korunní lístky růžové, bez ostruhy
- subsp. *pau*
- 'Plena' - květy různých barev
- 'Ruby Port'
- subsp. *vulgaris*
- 'William Guinness' - listy fialové

Vyhovují mu kraje listnatých i smíšených lesů, louky, paseky, atp. Roste v polostínu ve vlhké humózní půdě s vápencovým podkladem.

Fotografie převzata z <http://www.vkolacek.cz/> .

<https://www.rostliny.net/>