

Clerodendrum paniculatum (Klerodendron latnatý)

synonyma: *Caprifolium paniculatum*, *Cleianthus coccineus*, *Clerodendrum diversifolium*, *Clerodendrum pyramidale*, *Volkameria angulata*, *Volkameria diversifolia*

čeleď: Verbenaceae

oblasti: JV Asie

Roste v jihovýchodní Asii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do (1,3 -) 1,8 (i 2,5)m. Větve mají v mládí čtvercový průřez a mohou být ochlupené. Listy jsou široce vejčité, spodní laločnaté, horní vroubkovaně zubaté či celokrajné, tmavězelené, dlouhé do 40cm a báze je srdčitá. Květenstvím je terminální větvená lata o délce do 30cm, vlastní květy jsou červenooranžové s max. 1,7cm trubkou a laloky délky do 5mm. Plodem je kulovitá peckovice průměru 5 - 9mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Borneo Sunset' - listy jsou červenorůžovofialové, později zelenají; květy oranžové
- 'Pagoda' - výška 1,2 - 1,8m; květenstvím je 30 - 60cm dlouhá lata z oranžových květů
- 'Starshine'

Po odkvětu rostlinu seřezávejte, aby na jaře mohla vytvořit nový keřík s novými květy na koncích větvíček. Potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost (roste), bohatá zálivka a dostatek světla bez přímého slunečního. Na zimu jej umístěte do chladu o max. teplotě 15°C s minimální zálivkou.

<https://www.rostliny.net/>