Sprekelia

čeleď: Amaryllidaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest úředníka Hamburku J. H. von Sprekelsena (1691 - 1764). Pochází z Mexika a Guatemaly. Pod zemí vytváří cibuli. Nejznámějším druhem je S. formosissima.

Vyhovuje ji teplo, chráněné místo a dobře propustná vlhká půda bohatá na živiny. Není mrazuvzdorná. Cibule se během zimy skladují v suchu při teplotě 17 - 20°C.

Množí se dceřinými cibulkami nebo semeny.

Sprekelia formosissima (Sprekelie nejkrásnější)

synonyma: S. formisissima

oblasti: Guatemala, J Mexiko

Roste v Mexiku a Guatemale. Pod zemí vytváří cibuli o průměru 5cm s dlouhým krkem a tmavou slupkou. Dorůstá výšky 30 - 40 (i 45)cm. Do této výšky vyrůstají 1 - 3 duté mírně zploštělé stvoly se sytě červeným 1 (i 2) květy orientálního vzhledu, mohou dosáhnout v průměru 10 (i 12)cm, horní 2 korunní lístky jsou úzké, 3 spodní trychtýřovitě objímají tyčinky s pestíkem. Pak teprve vyrůstají mečovité tmavězelené listy. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bańos' - korunní lístky široké
- var. glauca - listy modrozelené
- 'Orient Red' - květy sytě červené
- 'Peru' - korunní lístky široké
- 'Superba' - květy sytě červené

Vyhovuje ji rozptýlené světlo, bohatá zálivka, teplo (17 - 23°C, neměla by nikdy klesnout pod 15°C) a pokud možno vlhčí vzduch. Cibule se na zimu uskladní v okamžiku, kdy zcela odumřou listy. V průběhu odumírání snižujte i zálivku. Vybere se chladné místo s teplotou kolem 7°C a zde přečká až do jara bez zálivky. Hnojí se v průměru asi 3 - 4x za měsíc.

Množí se dceřinými cibulkami.

Sprekelia howardii

oblasti: Colima, Guerrero, Oaxaca, Puebla

Roste v Mexiku. Listy jsou modrozelené, řemenovité, dlouhé 17 - 26cm a široké 4 - 9mm. Květy mají korunní lístky přibližně stejné šířky.

Další informace:
http://botany.cz/cs/sprekelia-formosissima/
http://www.celysvet.cz/sprekelia-formosissima.php