

## Cymbidium (Člunatec)

čeleď: Orchidaceae

Roste v Austrálii, subtropické a tropické Asie v podobě stálezelené terestrické orchideje. Dorůstá výšky 60 - 90cm. Úzké mečovité obloukovité listy vyrůstají z pahlíz ve 2 řadách. Květenství je až 30květé, vzpřímené, obloukovité nebo převislé, vlastní květy mají průměr 5 - 10cm, barvu v kombinacích zelené, žluté, bílé, růžové, červené nebo hnědé a zpravidla se skvrnitým spodním pyskem. Kvete na podzim a v zimě. Existuje nespočetné množství hybridů.

Mezi orchidejemi patří k jednodušším rodům na pěstování. Pro bohaté kvetení je důležité dodržet alespoň 5°C rozdíl mezi dnem a nocí. Potřebují světlé místo bez přímého poledního slunce, bohatou zálivku (kořeny nesmí být trvale ve vodě, využívejte výhradně měkkou nejlépe dešťovou vodu o pokojové teplotě). Dobré je také rodit listy. Po odkvětu snižte teplotu i zálivku a nechte rostlinu odpočívat. Přesazuje se až v okamžiku, kdy se kořeny nevezdou do květináče, vždy však až po odkvětu. Je vhodná pro letnění, na slunce si však musejí pomalu zvykat nejlépe v polostínu. V okamžiku, kdy teploty začnou klesat pod 10°C, rostlinu přemístěte domů. Hnojí se speciálními hnojivy pro orchideje. Jako substrát používáme směs hrubé borové kůry, polystyrenu, molitanu, suchého rašeliníku, keramzitu, atp.

### Cymbidium acuminatum

synonyma: *C. ensifolium* subsp. *acuminatum*

### Cymbidium aestivum

oblasti: J Čína, Střední Čína

Roste v Číně.

### Cymbidium aliciae

synonyma: *C. cyperifolium* var. *aliciae*

oblasti: Filipíny

Pochází z Filipín.

### Cymbidium aloifolium

synonyma: *Aerides borassii*, *C. erectum*, *C. intermedium*, *C. pendulum*, *C. simulans*, *Epidendrum aloides*, *Epidendrum aloifolium*, *Epidendrum pendulum*

oblasti: Himálaj, J Čína, Myanmar (Barma), Srí Lanka, Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste od Himálají po Malajsii jako epifyt. Pahlízy jsou zakrznělé. Řemenové tuhé listy dosahují délky až 40cm. Kvete v až 50cm květenství.

Vyhovuje jim substrát pro epifyty nebo přímo umístění na kůře s rašeliníkem. Na zimu potřebuje pauzu.

## Cymbidium atropurpureum

synonyma: C. atropurpureum var. olivaceum, C. finlaysonianum var. atropurpureum, C. pendulum var. atropurpureum

oblasti: Malajsie, Thajsko

Pochází z jižního Thajska a Malajsie.

## Cymbidium banaense

### Cymbidium bicolor

oblasti: Borneo, Himálaj, Indie, Indočína, J Čína, Malajsie, Srí Lanka

Pochází z jižní Číny, Indie a Bornea. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. bicolor - Indie, Srí Lanka
- subsp. obtusum - Himálaje, Indočína
- subsp. pubescens - Malajsie

## Cymbidium borneense

oblasti: Borneo

Pochází ze severozápadu Bornea.

## Cymbidium canaliculatum

synonyma: C. canaliculatum f. aureolum, C. canaliculatum f. barrettii, C. canaliculatum f. fuscum, C. canaliculatum f. purpurascens, C. canaliculatum f. sparkesii, C. canaliculatum var. barrettii, C. canaliculatum var. marginatum, C. canaliculatum var. sparkesii, C. sparkesii

oblasti: Queensland

Pochází ze severovýchodu Austrálie.

## Cymbidium changningense

synonyma: C. lowianum var. changningense

## Cymbidium chawalongense

oblasti: Xizang (Tibet)

Objevena i v Tibetu.

## Cymbidium chloranthum

synonyma: *C. pulchellum*, *C. sanguineum*, *C. sanguinolentum*, *C. variciferum*

oblasti: Malajsie, Velké Sundy

Pochází ze západní Malajsie a Indonésie.

### *Cymbidium cochleare*

synonyma: *C. babae*, *C. kanran* var. *babae*, *Cyperorchis babae*, *Cyperorchis cochleare*, *Cyperorchis cochlearis*, *Cyperorchis kanran* var. *babae*

oblasti: Himálaj, Tchaj-wan

Roste od Himálaje po Tchaj-wan.

### *Cymbidium concinnum*

#### *Cymbidium cultum* (Člunatec pěstovaný)

### *Cymbidium cyperifolium*

synonyma: *C. carnosum*, *C. viridiflorum*, *Cyperorchis wallichii*, *Geodorum longifolium*, *Limodorum cyperifolium*, *Limodorum longifolium*

oblasti: Filipíny, Himálaj, Indočína

Roste od Himálaje po Filipíny. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *cyperifolium* - Himálaje až jižní Čína
- subsp. *indochinese* - Indočína až Filipíny

### *Cymbidium dayanum*

synonyma: *C. acutum*, *C. alborubens*, *C. angustifolium*, *C. dayanum* subsp. *leachianum*, *C. dayanum* var. *albiflorum*, *C. dayanum* var. *austrojaponicum*, *C. dayanum* var. *leachianum*, *C. eburneum* var. *austrojaponicum*, *C. eburneum* var. *dayanum*, *C. eburneum* var. *dayi*, *C. leachianum*, *C. poilanei*, *C. pulcherrimum*, *C. simonsianum*, *C. simonsianum* f. *vernale*, *C. sutepense*

oblasti: Himálaj, Japonsko, Malajsie

Roste od Himálaje po jižní Japonsko a Malajsii.

### *Cymbidium defoliatum*

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### *Cymbidium devonianum*

synonyma: *C. rigidum*, *C. sikkimense*

oblasti: Nepál, Thajsko

Roste od Nepálu po severní Thajsko.

### **Cymbidium eburneum**

synonyma: *C. eburneum* var. *longzhouense*, *C. eburneum* var. *philbrickianum*, *C. eburneum* var. *williamsianum*, *C. syringodorum*, *Cyperorchis eburnea*

oblasti: Hainan, Himálaj, Myanmar (Barma)

Roste od Himálaje po Myanmar a Hainan.

### **Cymbidium elegans**

synonyma: *C. densiflorum*, *C. elegans* var. *lutescens*, *C. elegans* var. *obcordatum*, *C. longifolium*, *Cyperorchis elegans*, *Cyperorchis longifolia*, *Limodorum angustifolium*

### **Cymbidium elongatum**

oblasti: Borneo

Pochází ze severozápadního Bornea.

### **Cymbidium ensifolium**

synonyma: *C. albomarginatum*, *C. arrogans*, *C. ensifolium* f. *arcuatum*, *C. ensifolium* f. *falcatum*, *C. ensifolium* f. *flaccidior*, *C. ensifolium* var. *misericors*, *C. ensifolium* var. *rubrigemmum*, *C. ensifolium* var. *striatum*, *C. ensifolium* var. *susin*, *C. ensifolium* var. *xiphiiifolium*, *C. ensifolium* var. *yakibaran*, *C. estriatum*, *C. gonzalesii*, *C. gyokuchin*, *C. gyokuchin* var. *arrogans*, *C. gyokuchin* var. *soshin*, *C. kanran* var. *misericors*, *C. koran*, *C. micans*, *C. misericors*, *C. misericors* var. *oreophilum*, *C. niveomarginatum*, *C. prompovenium*, *C. rubrigemmum*, *C. shimaran*, *C. xiphiiifolium*, *C. yakibaran*, *C. yongfuense*, *Epidendrum ensifolium*, *Jensoa ensata*, *Limodorum ensatum*, *Liuguishania taiwanensis*

oblasti: Indočína, J Indie, Nová Guinea, Střední Asie, Vietnam

Pochází z tropů a jiných teplých částí Asie. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ensifolium* - Indočína, teplé části Aise
- subsp. *haematodes* - jižní Indie až Nová Guinea

### **Cymbidium erythraeum**

synonyma: *C. hennesianum*, *Cyperorchis hennisiana*

oblasti: Himálaj, J Čína, Myanmar (Barma), Nepál, Střední Čína, Vietnam

Roste od Himálaje po jižní a střední Čínu.

## Cymbidium erythrostylum

synonyma: *Cyperorchis erythrostyla*

oblasti: Vietnam

Pochází z Vietnamu.

## Cymbidium faberi

synonyma: *C. cerinum*, *C. fukiense*, *C. oiawakense*, *C. scabroserrulatum*, *Eulophia yunnanensis*, *Semiphagus evrardii*

oblasti: J Čína, Střední Asie, Střední Čína, Tchaj-wan, Uttarákhand

Roste od Uttaranchalu po Tchaj-wan. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. *faberi* - střední a jižní Čína po Tchaj-wan
- var. *szechuanicum* - Uttarákhand až střední a jižní Čína

## Cymbidium finlaysonianum

synonyma: *C. pendulum* var. *brevilabre*, *C. tricolor*, *C. wallichii*

oblasti: Kambodža, Malajsie

Roste od Indočíny po Malajsii jako epifyt. Pahlízy jsou zakrnělé. Řemenovité listy dorůstají délky až 50cm. Kvete 3 - 5cm žlutorůžovými květy v převislému květenství.

Potřebuje teplo a vlhko. Ani v zimě by teplota neměla klesnout pod 20°C.

## Cymbidium flavum

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

## Cymbidium floribundum

synonyma: *C. chawalongense*, *C. floribundum* f. *virescens*, *C. floribundum* var. *pumilum*, *C. illiberale*, *C. pumilum*, *C. pumilum* f. *virescens*

oblasti: J Čína, Tchaj-wan

Roste od jižní Číny po Tchaj-wan.

## Cymbidium gaoligongense

## Cymbidium goeringii

synonyma: *C. formosanum*, *C. formosanum* f. *albiflorum*, *C. forrestii*, *C. goeringii* f. *albiflorum*, *C. goeringii* var. *formosanum*, *C. goeringii* var. *mackinnonii*, *C. mackinnonii*, *C. pseudovirens*, *C. tentyozanense*, *C. uniflorum*, *C. virens*, *C. virescens*, *C. yunnanense*, *Maxillaria goeringii*

oblasti: Himálaj, V Asie

Roste od Himálaje po teplé části východní Asie. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. *goeringii*
- var. *gracillimum*
- var. *longibracteatum*
- var. *tortisepalum*

### *Cymbidium gongshanense*

oblasti: J Čína

Pochází z jižní Číny.

### *Cymbidium haematodes*

synonyma: *C. ensifolium* subsp. *haematodes*, *C. ensifolium* var. *haematodes*, *C. siamense*, *C. sinense* var. *haematodes*, *C. sundaicum*, *C. sundaicum* var. *estriatum*

oblasti: Nová Guinea

Roste v džunglích jižní a jihovýchodní Asie.

### *Cymbidium hartinahianum*

oblasti: Sumatra

Pochází ze severu Sumatry.

### *Cymbidium hookerianum*

synonyma: *C. giganteum* var. *hookerianum*, *C. grandiflorum*, *C. grandiflorum* var. *punctatum*, *Cyperorchis grandiflora*

oblasti: Himálaj, J Čína, Nepál

Roste od Nepálu po Čínu.

### *Cymbidium induratifolium*

### *Cymbidium insigne* (Člunatec skvělý)

synonyma: *C. insigne* f. *album*, *C. insigne* var. *album*, *C. insigne* var. *sanderi*, *C. sanderi*, *Cyperorchis insignis*

oblasti: Hainan, Thajsko, Vietnam

Roste od severního Thajska po Hainan.

### Cymbidium iridioides

synonyma: *C. giganteum*, *Cyperorchis gigantea*, *Iridorchis gigantea*, *Limodorum longifolium*

oblasti: Himálaj, J Čína, Střední Čína

Roste od Himálaje po střední a jižní Čínu.

### Cymbidium kanran

synonyma: *C. kanran* f. *purpurascens*, *C. kanran* var. *aestivale*, *C. kanran* var. *purpureohiemale*, *C. linearisepalum*, *C. linearisepalum* f. *atropurpureum*, *C. linearisepalum* f. *atrovirens*, *C. linearisepalum* var. *atropurpureum*, *C. linearisepalum* var. *atrovirens*, *C. nigrovenium*, *C. oreophilum*, *C. purpureohiemale*, *C. sinokanran*, *C. sinokanran* var. *atropurpureum*, *C. tosyaense*

oblasti: J Čína, J Japonsko

Roste od jižní Číny po jižní Japonsko.

### Cymbidium lancifolium

synonyma: *Cymbidiopsis lancifolia*, *C. aspidistrifolium*, *C. bambusifolium*, *C. caulescens*, *C. cuspidatum*, *C. gibsonii*, *C. javanicum*, *C. javanicum* var. *aspidistrifolium*, *C. javanicum* var. *pantlingii*, *C. kerrii*, *C. lancifolium* f. *aspidistrifolium*, *C. lancifolium* var. *aspidistrifolium*, *C. lancifolium* var. *papuanum*, *C. lancifolium* var. *syunitianum*, *C. longifolium* var. *aspidistrifolium*, *C. maclehoseae*, *C. nagifolium*, *C. papuanum*, *C. syunitianum*

oblasti: Nová Guinea, Vietnam

Pochází z tropické a subtropické Asie. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. *lancifolium*
- var. *papuanum* - Nová Guinea

### Cymbidium longifolium

oblasti: Himálaj, J Čína, Střední Čína

Roste od Himálaje po střední a jižní Čínu.

### Cymbidium longipes

### Cymbidium lowianum

synonyma: *C. giganteum* var. *lowianum*, *C. hookerianum* var. *lowianum*, *C. lowianum* f. *concolor*, *C. lowianum* var. *concolor*, *C. lowianum* var. *superbissimum*, *C. lowianum* var. *viride*, *Cyperorchis lowiana*

oblasti: Himálaj, Indie, JZ Čína, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam

Rodové jméno bylo vybráno na počest sběratele sira Huga Lowia (1824 - 1905). Roste od Číny po severní Indočínu jako epifyt. Pahlízy jsou oválné. Listy jsou řemenovité, dlouhé až 75cm a na jediné rostlině jich naleznete až 10ks. Květenství má až 1m vysoký stonek, vlastní květy jsou žlutozelené, s červeně zakončeným pyskem a průměrem do 10cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Concolor' - květy bronzově zelené, pysk béžový
- var. kalawense
- var. lowianum

Potřebuje chladnější teploty v létě a stále vlhký substrát.

### Cymbidium macrorhizon

synonyma: Aphyllorchis aberrans, Bletia nipponica, Cymbidiopsis macrorhiza, C. aberrans, C. aphyllum, C. macrorhizon var. aberrans, C. nipponicum, C. pedicellatum, C. sagamiense, C. szechuanensis, Pachyrhizanthe aberrans, Pachyrhizanthe aphylla, Pachyrhizanthe macrorhizos, Pachyrhizanthe nipponica, Pachyrhizanthe sagamiensis, Yoania aberrans

oblasti: Ásám, Myanmar (Barma), Pákistán, Thajsko, V Asie

Roste v Pakistánu, Indii, Myanmu a Thajsku. Dorůstá délky do 30cm. Květenství je 4 - 8mikvěté, listeny jsou malé, kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 0,5 - 1,2cm, kališní lístky jsou světle hnědosivozelené, občas narůžovofialovělé, zašpičatělé, dlouhé do 3cm, široké 5mm a korunní lístky jsou mírně kratší než široké.

### Cymbidium madidum

synonyma: C. albuciflorum, C. iridifolium, C. leae, C. leroyi, C. madidum var. leroyi, C. queeneanum

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste od Queenslandu po severní Nový Jižní Wales, Austrálie.

### Cymbidium maguanense

### Cymbidium mannii

synonyma: C. bicolor subsp. obtusum, C. crassifolium, C. flaccidum, C. pendulum var. purpureum

### Cymbidium mastersii

synonyma: C. affine, C. mastersii var. album, C. micromeson, Cyperorchis mastersii

oblasti: Čína, V Himálaj

Roste od východního Himálaje po Čínu.

### Cymbidium micranthum

oblasti: J Čína, JV Asie, Střední Čína

Roste od jižní a střední Číny po další teplé oblasti Asie.

### Cymbidium multiradicatum

oblasti: JZ Čína, V Himálaj

Roste od východního Himálaje po jihozápadní Čínu.

### Cymbidium munroanum

synonyma: C. ensifolium var. munroanum

### Cymbidium munronianum

oblasti: Himálaj, SV Indie

Roste od východního Himálaje po Assam.

### Cymbidium nanulum

oblasti: Hainan, Yunnan

Roste od jihozápadního Yunnanu po Hainan.

### Cymbidium omeiense

synonyma: C. faberi var. omeiense

### Cymbidium parishii

synonyma: C. eburneum var. parishii, Cyperorchis parishii

oblasti: Myanmar (Barma)

Pochází z jižního Myanmu.

### Cymbidium paucifolium

### Cymbidium qiubeiense

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

## Cymbidium rectum

oblasti: Borneo, Malajsie

Pochází z Malajsie a severního Bornea.

## Cymbidium recurvatum

### Cymbidium rhizomatosum

## Cymbidium roseum

synonyma: *Cyperorchis rosea*

oblasti: Malajsie

Pochází ze západní Malajsie.

## Cymbidium sanderae

synonyma: *C. parishii* var. *sanderae*

oblasti: Vietnam

Pochází z Vietnamu.

## Cymbidium schroederi

synonyma: *Cyperorchis schroederi*

oblasti: Vietnam

Pochází ze středního Vietnamu.

## Cymbidium serratum

synonyma: *C. formosanum* var. *gracillimum*, *C. goeringii* var. *gracillimum*, *C. goeringii* var. *serratum*, *C. gracillimum*

## Cymbidium sichuanicum

## Cymbidium sigmoideum

synonyma: *C. kinabaluense*, *Cyperorchis sigmoidea*

oblasti: Malajsie

Pochází ze západní Malajsie.

### Cymbidium sinense

synonyma: C. albojucundissimum, C. chinense, C. fragrans, C. hoosai, C. hoosai f. hakuran, C. sinense f. albojucundissimum, C. sinense f. aureomarginatum, C. sinense f. margicoloratum, C. sinense f. pallidiflorum, C. sinense f. taiwanianum, C. sinense f. viridiflorum, C. sinense var. albojucundissimum, C. sinense var. album, C. sinense var. bellum, C. sinense var. margicoloratum, C. sinense var. pallidiflorum, C. sinense var. taiwanianum, Epidendrum sinense, Wutongshania guangdongensis

oblasti: Střední Asie, SV Indie, Vietnam

Pochází z Assamu.

### Cymbidium suave

synonyma: C. gomphocarpum

oblasti: Nový Jižní Wales

Pochází z východní Austrálie.

### Cymbidium suavissimum

oblasti: Myanmar (Barma)

Pochází ze severu Myanmu.

### Cymbidium teretipetiolatum

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

### Cymbidium tigrinum

synonyma: Cyperorchis tigrina

oblasti: Čína, Střední Asie, SV Indie

Roste od Assamu po Čínu.

### Cymbidium tortisepalum

synonyma: C. faberi f. viridiflorum, C. goeringii f. viridiflorum, C. goeringii var. tortisepalum, C. longibracteatum var. tortisepalum, C. tortisepalum var. viridiflorum, C. tsukengensis

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. longibracteatum

### Cymbidium tracyanum

synonyma: *Cyperorchis tracyana*

oblasti: JZ Čína, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet)

Roste od jihovýchodního Tibetu po Čínu a Indočínu.

### *Cymbidium wadae*

#### *Cymbidium wenshanense*

synonyma: *C. quinquelobum*, *C. wenshanense* var. *quinquelobum*

oblasti: Čína, Vietnam

Roste od Číny po Vietnam.

#### *Cymbidium whiteae*

synonyma: *Cyperorchis whiteae*

#### *Cymbidium wilsonii*

synonyma: *C. giganteum* var. *wilsonii*, *Cyperorchis wilsonii*

oblasti: Čína

Pochází z Číny.

#### *Cymbidium x ballianum*

synonyma: *Cyperorchis x balliana*

#### *Cymbidium x baoshanense*

#### *Cymbidium x florinda*

#### *Cymbidium x gammieanum*

synonyma: *Cyperorchis x gammieana*

#### *Cymbidium x glebelandense*

synonyma: *C. x cooperi*, *Cyperorchis x glebelandensis*

#### *Cymbidium x hillii*

#### *Cymbidium x nomachianum*

Cymbidium x nuijangense

Cymbidium x oblancifolium

Cymbidium x pauwelsii

Cymbidium x purpuratum

Cymbidium x rosefieldense

synonyma: Cyperorchis x rosefieldensis

Cymbidium x woodlandense

synonyma: Cyperorchis x woodlandensis

Další informace:

[http://hobbyzahrada.cz/clanek-1747-orchideje\\_cymbidium\\_pro\\_pestovani\\_v\\_byte.htm](http://hobbyzahrada.cz/clanek-1747-orchideje_cymbidium_pro_pestovani_v_byte.htm)

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/cymbidium/>

[http://neviditelnytypes.lidovky.cz/priroda-cymbidium-neboli-clunatec-drv-/p\\_zviretnik.asp?c=A070305\\_221328\\_p\\_zviretnik\\_dru](http://neviditelnytypes.lidovky.cz/priroda-cymbidium-neboli-clunatec-drv-/p_zviretnik.asp?c=A070305_221328_p_zviretnik_dru)

<http://orchidej.wz.cz/cymbidium.html>

<http://rozkvetly-dum.cz/obchod/detail/59>

<http://www.garten.cz/a/cz/5137-cymbidium-hybridy-clunatec/>

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/4724-cymbidium-clunatec/>

<http://www.tvujdum.cz/tipy-triky/cymbidium-zaver-roku-se-spetkou-napeti.aspx>

<http://www.zeny.cz/magazin/pokojove-rostliny/jak-pestovat-orchideje--tentokrat-cymbidium-neboli-clunatec.aspx>

<https://www.rostliny.net/>