

Iva xanthiifolia (Pouva řepňolistá)

synonyma: *Cyclachaena pedicellata*, *Cyclachaena xanthiifolia*, *Euphrosyne xanthiifolia*, *Iva paniculata*, *Iva pedicellata*, *I. var. pedicellata*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming

Pochází z USA a Kanady. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 2 (i 3,6)m. Lodyha je přímá, může být větvená a v horní části drsně ochlupená. Listy jsou vstřícné, mají široce vejčitý až srdčitý tvar s hrub pilovým okrajem a dlouhý řapík. Kvete v drobných úborech seskupených do bezlistenového klasu nebo laty, vlastní květy jsou trubkovité, vnější samičí a vnitřní samčí.

Vyhovují ji rumišťe, náspy, případně i pole.

<https://www.rostliny.net/>