

Leersia (Tajnička)

čeleď: Poaceae

Existuje asi 17 druhů. Pochází z teplých oblastí a tropů Ameriky a Euroasie. Rodové jméno bylo vybráno na počest německého botanika jménem Johann Daniel Leers. Většinou se jedná o trvalky, pouze vyjimečně o jednoletky. Dorůstají výšek 0,3 - 1,5m. Čepele jsou ploché, skládané nebo svinuté. Kvete v kláscích tvořících latu.

Leersia affinis

Leersia alpina

synonyma: Encalypta ciliata var. alpina

oblasti: Alpy

Leersia brevicollis

Leersia hexandra

synonyma: Homalocenchrus hexandrus

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Leersia lenticularis

synonyma: Homalocenchrus lenticularis

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin

Leersia longicollis

synonyma: Encalypta longicollis

Leersia monandra

synonyma: Homalocenchrus monandrus

oblasti: Florida, Portoriko, Texas

Leersia mutica

Leersia oryzoides (Tajnička rýžovitá)

synonyma: Homalocenchrus oryzoides, Phalaris oryzoides

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Austrálie, Ázád Kašmír, Britská Kolumbie, Chajbar Paštunchwá, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Japonsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Slovensko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii, Severní Americe a Austrálii jako trvalka. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Stébla jsou vystoupavá nebo poléhavá, větvená, na kolénkách chlupatá a z dolních uzlin dokáže zakořenit. Listy jsou ploché, převíslé, drsné, pilovité dlouhé do 28 (i 30)cm, široké 1 - 1,5cm, pochvy jsou směrem zpět drsné a horní nafouklé. Květenstvím je řídká lata délky 5 - 17 (i 30)cm s křivými větévkami, je dlouho ukrytá v pochvě, plevy chybějí, klásky jsou 1květe, krátce stopkaté a úzce eliptické a dlouhé 4,5 - 7,5 (i 8)mm. Kvete pouze v teplých létech. Plodem je okoralá obilka. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyskytuje se při pobřeží vod v písčitých i bahnitých půdách.

Leersia procera

Leersia selwynii

Leersia streptocarpa

Leersia virginica

synonyma: Homalocenchrus virginicus, L. virginica var. ovata

oblasti: Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z východu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/leersia-oryzoides/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Tajni%C4%8Dka>

<https://www.rostliny.net/>