

Oxyria digyna (Šťovíček dvoublizný)

synonyma: *Acetosa digyna*, *Donia digyna*, *Donia sapida*, *Lapathum digynum*, *O. f. elatior*, *Oxyria elatior*, *Oxyria reniformis*, *Oxyria reniformis* var. *elatior*, *Rheum digynum*, *Rumex digynus*

čeleď: Polygonaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Apeniny, Arizona, Britská Kolumbie, Chorvatsko, Grónsko, Idaho, Írán, Island, J Karpaty, Jižní Dakota, Kalifornie, Kamčatka, Kavkaz, Kolorado, Korsika, Labrador, Laponsko, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, Newfoundland, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nunavut, Oregon, Pákistán, Polsko, Pyreneje, Quebec, S Sibiř, Severozápadní Teritorium, Slovensko, SV Sibiř, SZ Rusko, Špicberky, Švédsko, Švýcarsko, Ťan-šan, Texas, Ural, Utah, Velká Británie, Washington, Wyoming, Xizang (Tibet), Yukon, Z Karpaty, Z Rusko, Země Františka Josefa

Roste v chladných až polárních oblastech severní polokoule jako rozkladitá až vystoupavá trvalka. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 25 (i 45)cm. Vytváří 2 načervenalé stonky. Listy jsou sivě zelené a načervenalé, soustředěné při bázi, ledvinité až kulaté, zvlněné, průměru 2 - 4,5cm, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 13cm. Květy mají 1 - 2 (za plodu až 3)mm stopku, jsou drobné, zelené, později načervenalé. V dolní části jsou květy samčí. Plodem je 2křídla nažka průměru 2,5 - 3,5mm.

Vyskytuje se v arktické tundře a vysokých horách ve skalních štěrbinách, v suti, břehy vysokohorských toků, atp.

<https://www.rostliny.net/>