

## Cleistogenes (Dvouřadec)

synonyma: Kengia, Moliniopsis

čeleď: Poaceae

### Cleistogenes caespitosa

synonyma: Kengia caespitosa

### Cleistogenes festucacea

synonyma: C. foliosa, C. kitagawae var. foliosa, C. longiflora, C. striata, Kengia festucacea, Kengia foliosa, Kengia longiflora, Kengia striata

### Cleistogenes gatacrei

synonyma: Diplachne gatacrei, Kengia gatacrei

oblasti: Chajbar Paštúnchwá, SZ Indie

Roste v Indii a Pákistánu v podobě trvalky s mnoha články. Dorůstá výšky do 50cm. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou dlouhé 1,2 - 3cm a široké 1,5 - 2,5mm. Květenstvím je chudá lata délky do 7cm, větve jsou dlouhé do 4,5cm a nesou 3 - 4 vzdálené 4 - 5květé klásky délky do 1,3cm.

### Cleistogenes hackelii

synonyma: C. caespitosa var. ramosa, C. chinensis, C. chinensis var. nakaii, C. hackelii var. chinensis, C. hackelii var. nakaii, C. nakaii, C. ramiflora var. tianmushanensis, C. serotina var. aristata, C. serotina var. chinensis, C. serotina var. nakaii, Diplachne hackelii, Diplachne serotina f. angustifolia, Diplachne serotina var. aristata, Diplachne serotina var. chinensis, Kengia chinensis, Kengia hackelii, Kengia hackelii subsp. nakaii, Kengia nakaii

### Cleistogenes hancei

synonyma: Agrostis serotina, C. nakaii f. purpurascens, C. nakaii f. vivipara, C. nakaii var. purpurascens, C. serotina f. vivipara, C. serotina var. sinensis, C. serotina var. vivipara, Diplachne sinensis, Kengia hancei, Schenodorus serotinus

### Cleistogenes kitagawai

### Cleistogenes mucronata

synonyma: C. gracilis, Kengia gracilis, Kengia mucronata

### Cleistogenes neodoluzhkoi

synonyma: Kengia neodoluzhkoi

### Cleistogenes polyphylla

synonyma: *C. hackelii* var. *jeholensis*, *C. hancei* f. *jeholensis*, *C. hancei* var. *jeholensis*, *C. serotina* var. *jeholensis*, *Kengia polyphylla*

## **Cleistogenes ramiflora**

### **Cleistogenes serotina (Dvouřadec pozdní)**

synonyma: *Bromus strictus*, *Ceratochloa boryana*, *C. bulgarica*, *C. bulgarica* f. *pseudosquarrosa*, *C. maeotica*, *C. serotina* subsp. *bulgarica*, *Diplachne bulgarica*, *Diplachne patula*, *Diplachne serotina*, *Diplachne serotina* subsp. *bulgarica*, *Diplachne serotina* var. *clandestina*, *Festuca serotina*, *Kengia bulgarica*, *Kengia maeotica*, *Kengia serotina*, *Melica nodosa*, *Molinia serotina*, *Schedonorus serotinus*

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Švýcarsko

Dorůstá výšky 30 - 60cm. Vytváří krátké podzemní výběžky. Listy jsou 2řadě uspořádané v počtu 10 - 14ks a šedozelené. Květenstvím je lata s 2řadě uspořádanými větvemi, plevy jsou nestejné, blanité, na hřbetě zakulacené a mají 1 žilku. Patří mezi chráněné druhy C1.

Vyhovuje mu plné slunce a kamenité a krovité stráně.

### **Cleistogenes songorica**

synonyma: *C. mutica*, *Diplachne songorica*, *Kengia mutica*, *Kengia songorica*

### **Cleistogenes squarrosa**

synonyma: *C. andropogonoides*, *C. squarrosa* subsp. *andropogonoides*, *C. squarrosa* var. *longiaristata*, *Diplachne squarrosa*, *Diplachne squarrosa* var. *longiaristata*, *Kengia andropogonoides*, *Kengia squarrosa*, *Kengia squarrosa* var. *longearistata*, *Molinia squarrosa*

<https://www.rostliny.net/>