

Fimbristylis quinquangularis

synonyma: *Fimbristylis angularis*, *Fimbristylis benghalensis*, *Fimbristylis fauriei*, *Fimbristylis miliacea*, *Fimbristylis miliacea* subsp. *macroglumis*, *Fimbristylis miliacea* subsp. *pallens*, *Fimbristylis mucronata*, *F.* var. *bistaminifera*, *F.* var. *elata*, *Iria angularis*, *Iria miliacea*, *Iria quinquangularis*, *Isolepis angularis*, *Isolepis miliacea*, *Isolepis miliacea* var. *major*, *Isolepis pentagona*, *Isolepis tetragona*, *Scirpus benghalensis*, *Scirpus miliaceus*, *Scirpus niloticus*, *Scirpus parviflorus*, *Scirpus pentagonus*, *Scirpus quadrangularis*, *Scirpus quinquangularis*, *Scirpus salbundius*, *Trichelostylis angularis*, *Trichelostylis miliacea*, *Trichelostylis miliacea* var. *microstachya*, *Trichelostylis pentagona*, *Trichelostylis quinquangularis*, *Trichelostylis tetragona*

čeleď: Cyperaceae

oblasti: Austrálie, Indie, J Čína, Malajsie, Pákistán, Portoriko, Tchaj-wan

Roste od Pákistánu a Indie po Malajsi jako jednoletka, dále v Austrálii a Portoriku. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Stonek má průměr 0,5mm. Listy jsou široké 1 - 1,5mm. Květenství má průměr 1 - 3cm, tvoří jej 10 - 50 klásků, klásky jsou stopkaté, eliptické, špičaté, zelené až tmavěhnědé, dlouhé 2 - 4mm a široké 1 - 1,5mm. Plody jsou světležluté až světlehnědé, kulovité až široce obvejčité a dlouhé 0,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *macroglumis*
- subsp. *pallens*
- subsp. *quinquangularis*

<https://www.rostliny.net/>