

Codonanthe (Kodonanthe)

čeleď: Gesneriaceae

Pochází z tropické Ameriky, Brazílie, Guayany a Karibiku. Patří mezi stálezelené epifyty nebo méně často keře, byliny vytvářející plazivé nebo převislé kmínky. Bývají dlouhé kolem 30cm, mohou být ochlupené. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, sukulentní, tmavězelené a zakulacené. Kvete světlorůžovými až bílými zvonkově tvarovanými voskovými květy s 2ma pysky a každý z nich se 2 - 3ma laloky. Vnitřní strana trubky je žlutá. Plodem je bobule.

Množí se semeny.

Codonanthe calcarata

synonyma: *C. bipartita*, *Nematanthus calcaratus*

Codonanthe caribaea

synonyma: *C. eggersii*, *C. triplinervia*, *C. triplinervia* var. *latifolia*, *C. triplinervia* var. *purpurea*

oblasti: Karibik

Pochází z Trinidadu. Listy jsou vejčité nebo vejčitékopinaté, holé, dlouhé do 8cm a široké do 3,5cm. Kvete ve skupinách 1 - 4 květů s bílou korunou délky do 3,5cm a žlutou trubkou na vnitřní straně. Laloky jsou průsvitné.

Codonanthe carnososa

synonyma: *Coccanthera hookeriana*, *C. devosiana*, *C. florida*, *C. hookeri*, *C. hookeri* f. *oblongifolia*, *Columnea scandens-hirsuta*, *Hypocyrtia carnososa*

oblasti: J Brazílie

Roste na jihu Brazílie. Listy jsou obvejčité nebo široce eliptické, hnědě ochlupené, dlouhé do 2,5cm a široké do 1,5cm. Kvete po 1 - 2ks bílými květy s narůžovělouází. Vnější strana je ochlupená, při bázi červenohnědě skvrnitá. Trubka má délku do 1cm.

Codonanthe chiricana

Codonanthe cordifolia

Codonanthe corniculata

Codonanthe crassifolia (Kodonanthe tučnolistá)

synonyma: *Centrosolenia glabra*, *C. confusa*, *C. formicarum*, *Episcia hookeri*, *Hypocyrtia crassifolia*

oblasti: Belize, Guatemala, Panama, S Jižní Amerika

Roste v Guatemale, Belize, Panamě a na severu Jižní Ameriky v podobě malého epifytického plazivého či šplhavého keře nebo polokeře. Často převisá a v uzlinách dokáže znovu zakořenit. Kmínky jsou holé, lesklé, v mládí řídce ochlupené. Listy jsou krátce řapíkaté, kožovité, vejčité až kopinaté či oválné s koncem špičatým nebo tupým, zaoblenou či špičatou bází, celokrajným okrajem, holým povrchem, délkou 2 - 5cm a šířkou 1 - 2cm. Kvete po 1 - 4ks v paždí listů na 0,5 - 1,5cm stopkách. Kališní cípy jsou čárkovitěkopinaté, zašpičatělé, krátce ochlupené, dlouhé 4 - 9mm v barvě bílé nebo nažloutlé, růžově pruhované, trubka někdy nafialovělá. Plody jsou růžové až světle růžovofialové, široce vejčité až kulovité, dlouhé 0,9 - 1,2cm a široké 7 - 9mm.

Codonanthe devosiana

synonyma: *Aeschynanthus albus*, *Aeschynanthus gracilis*, *Aeschynanthus pulchellus*, *Coccanthera devosiana*, *C. digna*, *C. paula*

Codonanthe dissimulata

oblasti: Peru

Roste v Peru. Listy jsou dlouhé do 9cm a široké do 3,6cm, jsou nápadně různé velikosti, eliptického tvaru a menší listy obvykle opadávají. Kvete po 1 - 2ks bílými květy o délce do 2,5cm, vnitřní strana je nažloutlá, ostuha má délku do 4mm, laloky jsou odstálé, dlouhé do 2mm.

Codonanthe elegans

Codonanthe erubescens

Codonanthe formicarum

Codonanthe gibbosa

Codonanthe gracilis

synonyma: *C. picta*, *C. ventricosa*, *Columnnea gracilis*, *Hypocyrtia gracilis*, *Orobanche ventricosa*

oblasti: J Brazílie

Roste v jižní Brazílii. Listy jsou párovité, stejné velikosti, úzce eliptické až vejčité a hřebíkaté. Kvete po 1 - 2ks bílými květy se žlutou bází, červeným nebo hnědočerveným tečkováním, délkou 2,2cm a až 6mm laloky.

Codonanthe luteola

oblasti: Panama

Roste v Panamě. Listy jsou obevejčité, tupé, sukulentní, dlouhé do 3,5cm a široké 2cm. Kvete ve vrcholcích světležlutými květy s ostrouhou, červenými tečkami, hrdlem délky do 4cm a s

tmavěružovým nádechem. Lem má v průměru až 1,7cm.

Codonanthe macradenia

synonyma: *C. decurrens*, *Columnea calcarata*

oblasti: Belize, Guatemala, Mexiko, Nikaragua

Roste v Guatemale, Mexiku, Belize a Nikaragui v podobě malého polokeřovitého šplhavého nebo plazivého epifytu s holým kmínkem. V uzlinách dokáže zakořenit. Listy jsou vstřícné, nestejně velikosti, mají krátké řapíky, ztlustlou čepel, spodní stranu bledší narůžovělou, povrch kožovitý, tvar obkopynatý až eliptický či zakulacený s krátkou špičkou, protaženou až sbíhavou bází, holým povrchem, celokrajným nebo zanedbatelně pilovitým okrajem, mají délku 3 - 7,5cm a šířku 1,5 - 3cm. Kvete samostatnými květy v paždí horních listů na krátké stopce. Kališní laloky jsou úzce kopinaté, zašpičatělé, ochlupené, nestejně dlouhé, dlouhé 3 - 5mm. Koruna je bílá, světleružová nebo bílá s růžovými až fialovými pruhy. Na délku měří 3 - 4cm, horní pysk je vzpřímený, dlouhý až 5mm, spodní laloky mají délku do 7mm. Plody jsou růžovočervené až růžovofialové, kulovité, průměru 1 - 1,4cm.

Codonanthe mattos-silvae

Codonanthe serrulata

Codonanthe stenantha

Codonanthe uleana

synonyma: *C. decurrens*, *C. uleana* var. *integrifolia*, *Columnea calcarata*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Peru

Roste v Brazílii, Bolívii, Kolumbii a Peru. Listy jsou stejně veliké, eliptické, vejčité, obvejčité nebo obkopynaté, mělce zubaté na konci, občas i načervenalé, dlouhé do 7cm a široké do 3,5cm. Kvete po 1 - 3ks s bílou korunou délky do 3,3cm, spodní strana je nažloutlá, laloky jsou narůžovělé, rozložené, dlouhé do 4mm.

Codonanthe ulei

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Brazílii a Peru. Listy jsou dlouhé do 30cm a široké do 9cm, mají obkopynatý až obvejčitý tvar, ale nejsou stejně veliké. Naleznou se i zakrnělé listy. Kvete ve skupinách světleružovými květy s červenofialovými tečkami, zaoblenými až 2mm laloky a korunou délky do 1,8cm.

Codonanthe venosa

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1082>

<https://www.rostliny.net/>