

# Cotyledon barbeyi

synonyma: *Cotyledon sturmiana*, *Cotyledon transvaalensis*, *Cotyledon wickensii*, *Cotyledon wickensii* var. *glandulosa*

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Eritrea, Etiopie, Jemen, Keňa, KwaZulu-Natal, Mosambik, Somálsko, Súdán, Tanzánie, Transvaal, Zimbabwe

Roste od Jemenu přes východní po jižní Afriky v podobě byliny až keře. Dorůstá výšky 0,7 - 2 (i 3)m. Kmínky jsou ztlustlé a růžové. Listy jsou seskupené na koncích větví, vstřícné, dužnaté, šedozelené, bíle ožíněné, čárkovité, zaoblené i zašpičatěné, dlouhé 4 - 9 (i 16)cm, široké 1,5 - 3,5 (i 6)cm. Kvete převislými žlutými, růžovými nebo červenými květy na až 50cm dlouhé latě, korunní lístky jsou zkroucené, dlouhé 2,3 - 2,7cm a trubka je dlouhá 0,8 - 1,5cm.

Vyhovují mu kamenité půdy a skalní pukliny s mělkou půdou, vlhkým vzduchem a pravidelnými srážkami. Snáší i teploty blížíící se k 0°C.

<https://www.rostliny.net/>