

Dysphania ambrosioides

synonyma: *Ambrina ambrosioides*, *Ambrina ambrosioides* var. *anthelmintica*, *Ambrina anthelmintica*, *Ambrina incisa*, *Ambrina parvula*, *Ambrina spathulata*, *Atriplex ambrosioides*, *Atriplex anthelmintica*, *Blitum ambrosioides*, *Botrys ambrosioides*, *Botrys anthelmintica*, *Chenopodium album* subsp. *ambrosioides*, *Chenopodium amboanum*, *Chenopodium ambrosioides*, *Chenopodium ambrosioides* f. *angustifolium*, *Chenopodium ambrosioides* f. *dentatum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *integrifolium*, *Chenopodium ambrosioides* f. *minus*, *Chenopodium ambrosioides* f. *pinnatifidum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *rotundatum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *spathulatum*, *Chenopodium ambrosioides* f. *suffruticosum*, *Chenopodium ambrosioides* subsp. *suffruticosum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *angustifolium*, *Chenopodium ambrosioides* var. *anthelminticum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *costei*, *Chenopodium ambrosioides* var. *dentatum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *genuinum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *integrifolium*, *Chenopodium ambrosioides* var. *oblanceolatum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *obovata*, *Chenopodium ambrosioides* var. *obovatum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *pinnatifidum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *pubescens*, *Chenopodium ambrosioides* var. *querciforme*, *Chenopodium ambrosioides* var. *suffruticosum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *typicum*, *Chenopodium ambrosioides* var. *vagans*, *Chenopodium angustifolium*, *Chenopodium anthelminticum*, *Chenopodium anthelminticum* var. *glabratum*, *Chenopodium anthelminticum* var. *hastatum*, *Chenopodium anthelminticum* var. *subhirsutum*, *Chenopodium citriodorum*, *Chenopodium cuneifolium*, *Chenopodium integrifolium*, *Chenopodium integrifolium* subsp. *ramosissimum*, *Chenopodium opulifolium* subsp. *amboanum*, *Chenopodium querciforme*, *Chenopodium querciforme* var. *minus*, *Chenopodium sancta-maria*, *Chenopodium santamaria*, *Chenopodium spathulatum*, *Chenopodium spathulatum* var. *angustifolium*, *Chenopodium spathulatum* var. *platyphyllum*, *Chenopodium suffruticosum*, *Chenopodium suffruticosum* subsp. *remotum*, *Chenopodium vagans*, *Chenopodium variegatum*, *Dysphania anthelmintica*, *Orthosporum ambrosioides*, *Orthosporum suffruticosum*, *Roubieva anthelmintica*, *Teloxys ambrosioides*, *Teloxys vagans*, *Vulvaria ambrosioides*

čeleď: Chenopodiaceae

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Evropa, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, J Mexiko, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste ve střední Americe, Jižní Americe, jižním Mexiku a teplém či subtropickém prostředí Evropy. Patří mezi jednoletky nebo krátce žijící trvalky. Dorůstá výšky 0,25 - 1,2m. Stonek je nepravidelně větvený. Listy mají podlouhlý až obkopinatý tvar délky do 12cm a krátké řapíky. Květ má velikost 1,5mm. Lze ji využít v potravinářství i léčitelství.

<https://www.rostliny.net/>