

## Zannichellia (Šejdračka)

synonyma: Pelta, Pseudalthenia, Vleisia

čeleď: Potamogetonaceae

Rodové jméno bylo pojmenováno na počest italského botanika jménem G. G. Zannichelli.

### Zannichellia andina

### Zannichellia aschersoniana

synonyma: Pseudalthenia aschersoniana, Vleisia aschersoniana

### Zannichellia contorta

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá délky 5cm.

### Zannichellia major

synonyma: Z. palustris subsp. major

oblasti: Dánsko, Německo, Norsko, Polsko, Rumunsko, Sicílie, SZ Rusko, Švédsko, Turecko

Pochází z Evropy.

Roste v brakických vodách.

### Zannichellia obtusifolia

oblasti: Andalusie, Itálie, Středozeří

Roste v brakických vodách středozeří jako jednoletka. Dorůstá délky 12cm.

### Zannichellia palustris (Šejdračka bahenní)

synonyma: Algoides palustre, Pelta palustris, Potamogeton contortus, Z. aculeata, Z. brachystemon, Z. clausii, Z. contorta, Z. cothenetii, Z. cyclostigma, Z. dentata, Z. digyna, Z. echinata, Z. gibberosa, Z. indica, Z. intermedia, Z. komarovii, Z. laevis, Z. lingulata, Z. macrostemon, Z. major, Z. marina, Z. maritima, Z. melitensis, Z. obtusifolia, Z. palustris subsp. aculeata, Z. palustris subsp. dentata, Z. palustris subsp. major, Z. palustris subsp. marina, Z. palustris subsp. pedicellata, Z. palustris subsp. pedunculata, Z. palustris subsp. peltata, Z. palustris subsp. repens, Z. palustris subsp. rosenii, Z. palustris subsp. tenuis, Z. palustris var. aculeata, Z. palustris var. contorta, Z. palustris var. indica, Z. palustris var. japonica, Z. palustris var. major, Z. palustris var. minor, Z. palustris var. muricata, Z. palustris var. pedicellata, Z. palustris var. pedunculata, Z. palustris var. radicans, Z. palustris var. repens, Z. palustris var. stipitata, Z. pedicellata, Z. pedicellata f. gracilis, Z. pedicellata subsp. pedunculata, Z. pedicellata var. dimorphanthera, Z. pedicellata var. gibberosa, Z. pedicellata var.

homoeanthera, Z. pedicellata var. marina, Z. pedunculata, Z. pedunculata var. maritima, Z. pedunculata var. stagnalis, Z. peltata, Z. polycarpa, Z. prodanii, Z. pumila, Z. qinghaiensis, Z. radicans, Z. repens, Z. repens var. aerea, Z. repens var. viridis, Z. rosenii, Z. stylaris, Z. subulata, Z. tenuis

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jugoslávie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Makedonie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Střední středozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v brakických vodách v Severní i Jižní Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Dorůstá výšky (5 -) 25 - 40 (i 90)cm. Lodyhy v dolní části v uzlinách znovu zakořeňují. Listy jsou vstřícné a nitkovité. Kvete zdánlivě v úžlabí a jsou jednopohlavné. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. maojr
- subsp. palustris (Šejdračka bahenní pravá) - plody mají max. 1mm stopku
- subsp. pedicellata (Šejdračka bahenní stopečkatá) - plody mají 1,5 - 2,5mm stopku
- subsp. peltata

Vyhovují je mělké stojaté bahnitě vody.

### Zannichellia peltata

oblasti: Andalusie, Itálie

Patří mezi jednoletky. Dorůstá délky 10 - 18cm.

<https://www.rostliny.net/>