

Zannichellia palustris (Šejdračka bahenní)

synonyma: *Algoides palustre*, *Pelta palustris*, *Potamogeton contortus*, *Zannichellia aculeata*, *Zannichellia brachystemon*, *Zannichellia clausii*, *Zannichellia contorta*, *Zannichellia cothenetii*, *Zannichellia cyclostigma*, *Zannichellia dentata*, *Zannichellia digyna*, *Zannichellia echinata*, *Zannichellia gibberosa*, *Zannichellia indica*, *Zannichellia intermedia*, *Zannichellia komarovii*, *Zannichellia laevis*, *Zannichellia lingulata*, *Zannichellia macrostemon*, *Zannichellia major*, *Zannichellia marina*, *Zannichellia maritima*, *Zannichellia melitensis*, *Zannichellia obtusifolia*, *Z. subsp. aculeata*, *Z. subsp. dentata*, *Z. subsp. major*, *Z. subsp. marina*, *Z. subsp. pedicellata*, *Z. subsp. pedunculata*, *Z. subsp. peltata*, *Z. subsp. repens*, *Z. subsp. rosenii*, *Z. subsp. tenuis*, *Z. var. aculeata*, *Z. var. contorta*, *Z. var. indica*, *Z. var. japonica*, *Z. var. major*, *Z. var. minor*, *Z. var. muricata*, *Z. var. pedicellata*, *Z. var. pedunculata*, *Z. var. radicans*, *Z. var. repens*, *Z. var. stipitata*, *Zannichellia pedicellata*, *Zannichellia pedicellata f. gracilis*, *Zannichellia pedicellata subsp. pedunculata*, *Zannichellia pedicellata var. dimorphanthera*, *Zannichellia pedicellata var. gibberosa*, *Zannichellia pedicellata var. homoeantha*, *Zannichellia pedicellata var. marina*, *Zannichellia pedunculata*, *Zannichellia pedunculata var. maritima*, *Zannichellia pedunculata var. stagnalis*, *Zannichellia peltata*, *Zannichellia polycarpa*, *Zannichellia prostanii*, *Zannichellia pumila*, *Zannichellia qinghaiensis*, *Zannichellia radicans*, *Zannichellia repens*, *Zannichellia repens var. aerea*, *Zannichellia repens var. viridis*, *Zannichellia rosenii*, *Zannichellia stylaris*, *Zannichellia subulata*, *Zannichellia tenuis*

čeleď: Potamogetonaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Amerika, Jižní Dakota, Jugoslávie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Makedonie, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Střední středozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v brakických vodách v Severní i Jižní Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Dorůstá výšky (5 -) 25 - 40 (i 90)cm. Lodyhy v dolní části v uzlinách znovu zakořenují. Listy jsou vstřícné a nitkovité. Kvete zdánlivě v úzlabí a jsou jednopohlavné. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. maojr
- subsp. palustris (Šejdračka bahenní pravá) - plody mají max. 1mm stopku
- subsp. pedicellata (Šejdračka bahenní stopečkatá) - plody mají 1,5 - 2,5mm stopku
- subsp. peltata

Vyhovují je mělké stojaté bahnité vody.