

Ceanothus (Latnatec)

čeleď: Rhamnaceae

Pochází ze Severní Ameriky a centrem vývoje je Kalifornie. Roste v podobě krátkověkého keře nebo malého stromu o výškách 0,5 - 7m. Většina druhů je stálezelená, ostatní adaptované na chladné zimy jsou opadavé. Listy jsou vstřícné nebo střídavé, většinou 1 - 5cm dlouhé, jednoduché a zpravidla se zubatým okrajem. Květy modrými nebo fialovými (i růžovými nebo bílými) květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Cushion' - výška 1m, šířka 2,5m; větve obloukovité; květy bohaté, modrofialové
- 'Blue Jeans' - výška i šířka 2,5m; stálezelený, listy kožovité, tmavězelené; květy modré
- 'Burkwoodii' - výška 1,8 - 2,5m; stálezelený, listy zelené, lesklé; květy modré
- 'Concha' - rozložitý habitus; výška 1,5 - 2m, šířka min. 2,5m; stálezelený; květy modré, poupata načervenalá
- 'Delight' - výška 4,5m; stálezelený, listy bledězelené; květy tmavěmodré
- 'Frosty Blue' - rozložitý habitus; výška 3m, šířka větší; stálezelený; květy bíle ožíněné
- 'Percy Picton' - hustý habitus; výška 3m; stálezelený, listy husté; květy drobné, bohaté, tmavěmodré až fialové
- 'Ray Hartman' - dorůstá výšky i šířky do 6m; květenstvím je lata, květy šedomodré

Množí se semeny, které musí projít scarifikací a stratifikací. Namáčejí se na půl dne do vody a po dobu 1 - 3 měsíců se uskladňují při teplotě 1°C.

Ceanothus americanus

synonyma: *C. americanus* var. *glaber*, *C. americanus* var. *intermedius*, *C. americanus* var. *pitcheri*, *C. decumbens*, *C. dillenianus*, *C. ellipticus*, *C. glomeratus*, *C. hybridus*, *C. intermedius*, *C. latifolius*, *C. levigatus*, *C. macrocarpus*, *C. macrophyllus*, *C. milleri*, *C. multiflorus*, *C. officinalis*, *C. ovalifolius*, *C. perennis*, *C. pitcheri*, *C. procumbens*, *C. reclinator*, *C. sanguineus*, *C. tardiflorus*, *C. trinervus*, *C. virgatus*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Ceanothus arboreus

synonyma: *C. arboreus* var. *glaber*, *C. sorediatus*, *C. velutinus* var. *arboreus*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě stálezeleného nízce větveného stromu se silným kmenem. Dorůstá výšky až 10m. Listy jsou tmavě zelené a na spodní straně plstnaté. Květenstvím je lata a vlastní květy jsou modré. Plodem je trojlaločná 3úhelníková tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Mist' - květy světlejší, šedomodré

Ceanothus bolensis

Ceanothus buxifolius

synonyma: C. ferox

Ceanothus caeruleus

synonyma: C. axillaris, C. azureus, C. bertinii, C. bicolor, C. candolleanus, C. glandulosus

oblasti: Guatemala, Mexiko

Roste v Mexiku a Guatemale.

Ceanothus confusus

Patří mezi endemity Kalifornie. Dorůstá výšky a šířky 1,2m. Borka je šedohnědá s červenými přerušovanými texturami. Listy jsou stálezelené a vyrůstají vstřícně. Jsou dlouhé 2cm, oválného tvaru s 3 - 5 zuby na okraji. Horní strana je svěže zelená, spodní vybledlá. Kvete v drobných hroznech modrými nebo fialovými květy. Plodem je tobolka nepravidelného tvaru o 1cm šířce.

Ceanothus connivens

oblasti: Kalifornie

Ceanothus cordulatus

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon

Pochází z Kalifornie. Dorůstá výšky kolem 1,5m. Větve jsou šedivé se žlutozelenými novými větvkami. Listy jsou stálezelené, vyrůstají střídavě a dlouhé 3cm. Mají oválný tvar obvykle bez zubů na okraji. Mohou být i zvlněné. Plodem je tobolka o velikosti 0,5cm se 3 semeny.

Ceanothus crassifolius

synonyma: C. crassifolius var. planus, C. verrucosus var. crassifolius

oblasti: Kalifornie

Pochází z jižní Kalifornie. Roste ve vzpřímeném tvaru. Listy jsou stálezelené s široce rozprostřenými zubatými kraji. Spodní strana je světlejší. Kvete bílými květy, které mohou být nažloutlé nebo narůžovělé. Plodem je nepravidelná tobolka o velikosti menší než 1cm.

Ceanothus cuneatus

synonyma: C. cuneatus var. cinerascens, C. cuneatus var. dubius, C. cuneatus var. ramulosus, C. cuneatus var. rufescens, C. cuneatus var. submontanus, C. ramulosus, C. submontanus, Rhamnus cuneatus

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou stálezelené s jemnými nepočetnými zuby na krajích. Kvete bílými narůžovělými květy v kulovém květenství. Plodem je tobolka nepravidelného tvaru o velikosti 0,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. fascicularis
- subsp. rigidus - poloostrov Monterey; výška do 1,8m; větve tuhé; listy obvejčité, zubaté až celokrajné, na spodní straně šedé; květenstvím je úžlabní lata, vlastní květy jsou tmavě červenomodré
- 'Snowball' - květy bílé
- subsp. sonomensis

Množí se semeny. Podmínkou ale je, že musí projít ohněm.

Ceanothus cyaneus

oblasti: Kalifornie

Pochází z Kalifornie. Roste v podobě vzpřímeného keře, který může dosáhnout výšky i 5m. Větve jsou šedozelené, mladší jsou zelenohnědé. Listy jsou stálezelené se zubovým okrajem. Spodní strana je světlejší než vrchní. Květenství může být i delší než 15cm. Vlastní kvítky mají modrou barvu. Plodem je 4mm tobolka.

Ceanothus decornutus

oblasti: Kalifornie

Roste v USA.

Ceanothus dentatus

synonyma: C. dentatus subsp. floribundus, C. dentatus var. floribundus, C. floribundus, C. papillosus var. dentatus, C. papillosus var. floribundus

Patří mezi endemity Kalifornie z jejího středního skalnatého pobřeží, zálivů a kaňonů. Keř dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou stálezelené a vyrůstají střídavě. Délka nepřesahuje 2cm, okraje jsou zubaté a spodní strana je světlejší než horní. Kvete v hroznech sytěmodrými květy. Plodem je laločnatá tobolka o šířce asi 4mm.

Ceanothus depressus

synonyma: C. durangoanus, C. huichagorare, C. pueblensis

Ceanothus divergens

oblasti: Kalifornie

Pochází ze severního pobřeží Kalifornie, USA. Kvete růžovofialovými květy.

Ceanothus diversifolius

synonyma: *C. decumbens*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Nepřevyšuje obvykle výšku 30cm. Mladé větve jsou žlutozelené, staré načervenalé. Stálezelené listy mají oválný tvar, délku 5cm a zubatý okraj. Barva květů je modrobílá. Plodem je několikamilimetrová tobolka.

Ceanothus fendleri

synonyma: *C. endlichii*, *C. fendleri* var. *venosus*, *C. fendleri* var. *viridis*, *C. subsericeus*

oblasti: Arizona, Jižní Dakota, Kolorado, Nové Mexiko, S Mexiko, Texas, Utah, Wyoming

Pochází ze severního Mexika a jihu USA. Dorůstá výšky kolem 1m. Mladé větve jsou šedozelené, starší hnědočervené. Květenství se skládá z mnoha drobných bílých kvítků.

Ceanothus ferrisiae

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Roste ve vzpřímené podobě do výšky blížící se 2m. Mladé výhony jsou šedé, starší načervenalé. Stálezelené listy vyrůstají vstřícně a jsou 3cm dlouhé a zubaté po kraji. Horní strana je tmavě zelená, spodní světlejší s texturou. Kvete v drubných hroznech bílých květů. Plodem je nepravidelná tobolka o velikosti menší než 1cm.

Ceanothus foliosus

synonyma: *C. austromontanus*, *C. dentatus* var. *dickeyi*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Roste ve vzpřímené podobě do 2m výšky. Větve se snášejí dolů. Stálezelené listy jsou dlouhé 1 - 2cm. Plodem je 4mm tobolka se 3 semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *foliosus*
- var. *medius*
- var. *vineatus*

Ceanothus fresnensis

synonyma: *C. rigidus* var. *fresnensis*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Dorůstá šířky až 6m. Větve má červenohnědé. Stálezelené oválné listy s občas zubatým okrajem vyrůstají vstřícně a délka nepřesahuje 2cm. Kvete drobnými modrými květy o délce 0,5cm.

Ceanothus gloriosus

synonyma: *C. prostratus* var. *grandifolius*, *C. rigidus* var. *grandifolius*, *C. verrucosus* var. *grandifolius*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě stálezeleného široce rozložitého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1,8 (i 2)m. Listy jsou vstřícné, oválné, tmavězelené, kožovité a dlouhé 5cm. Kvete modrofialovými květy. Plodem je tobolka široká 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Emily Brown' - menší; listy zubaté; květy tmavěmodré
- var. *exaltatus*
- var. *gloriosus*
- var. *porrectus*

Ceanothus greggii

synonyma: *C. australis*, *C. greggii* var. *orbicularis*, *C. verrucosus* var. *greggii*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko, Texas, Utah

Pochází z jihozápadu USA a severního Mexika. Roste v podobě vzpřímeného pouštního keře o výšce až 2m. Borka má šedou barvu. Stálezelené listy vyrůstají vstřícně a mají různé tvary. Mohou mít zubatý okraj. Kvete drobnými bílými květy. Plodem je tobolka několik mm široká obsahující 3 semena. Semena potřebují scarifikaci teplem. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *greggii*
- var. *perplexans*
- var. *vestitus*

Ceanothus griseus

synonyma: *C. griseus* var. *horizontalis*, *C. thyrsiflorus* var. *griseus*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky do 2,5m a větší šířky. Listy jsou široce vejčité, tmavězelené a na spodní straně plstnaté. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou modré až fialové. Plodem je 4mm tobolka se 3 semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *horizontalis* - nízký poléhavý habitus
- 'Hurricane Point'
- 'Yankee Point'

Ceanothus hearstiorum

oblasti: Kalifornie

Druhové jméno bylo vybráno na počest rodiny Hearstových, kde byl poprvé objeven. Roste v USA v podobě stálezeleného z části poléhavého keře. Dorůstá výšky do 30cm a zpravidla bývá širší než vysoký (až 2m). Listy jsou malé, oválné, s jemným zoubkováním a celkově zkrabatělým povrchem se zapuštěnou žilnatinou. Kvete drobnými fialovými až tmavěmodrými květy.

Ceanothus herbaceus

synonyma: *C. americanus* var. *herbaceus*, *C. baumannianus*, *C. fontanesianus*, *C. glandulosus*, *C. grandiflorus*, *C. herbaceus* var. *pubescens*, *C. intermedius*, *C. ovalis*, *C. ovatus*, *C. ovatus* f. *pubescens*, *C. ovatus* var. *pubescens*, *C. pubescens*

oblasti: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Quebec, Severní Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Ceanothus impressus

synonyma: *C. impressus* var. *nipomensis*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě stálezeleného keře. Dokáže dorůst do výšky 1,8 - 3m a v šířky i 7m. Listy jsou oválné, podvinuté, tlusté, kožovité, lesklé a dlouhé 2cm. Květenstvím je hrozen a vlastní květy jsou modrofialové. Plodem je 4mm tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *impressus*
- var. *nipomensis*
- 'Puget Blue' - květy modré

Ceanothus incanus

synonyma: *C. incanus* f. *spinossimus*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Ve vzpřímené podobě dorůstá výšky 4m. Borku má šedou. Listy jsou stálezelené, vyrůstají střídavě, mají oválný tvar a občas zoubkovaný okraj. Kvete drobnými bílými květy. Plodem je laločnatá tobolka o velikosti 0,5cm se 3 semeny.

Ceanothus integerrimus

synonyma: *C. andersonii*, *C. californicus*, *C. integerrimus* var. *californicus*, *C. integerrimus* var. *macrothyrsus*, *C. integerrimus* var. *mogollonicus*, *C. integerrimus* var. *peduncularis*, *C. integerrimus* var. *puberulus*, *C. macrothyrsus*, *C. mogollonicus*, *C. myrianthus*, *C. nevadensis*, *C. peduncularis*, *C. puberulus*, *C. thysiflorus* var. *macrothyrsus*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nové Mexiko, Oregon, Washington

Pochází ze západu USA. Dorůstá výšky 1 - 4m. Listy vyrůstají střídavě, jsou opadavé, eliptického nebo oválného tvaru. Délka se pohybuje v rozmezí 2,5 - 8cm. Okraje jsou jemně zubaté. Kvete bílými, modrými a řídce růžovými květy. Květní hrozen je až 15cm dlouhý. Plodem je tobolka velikosti 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *californicus*
- var. *integerrimus*
- var. *macrothyrsus*

- var. puberulus

Ceanothus jepsonii

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. albiflorus - výška 0,5m
- var. jepsonii - výška 1m

Ceanothus lanuginosus

synonyma: C. greggii var. lanuginosa

Ceanothus lemmonii

synonyma: C. diversifolius var. foliosus

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Borka je šedá, nové větve jsou zelené. Stálezelené listy vyrůstají střídavě, mají oválný tvar a spodní strana je světlejší. Kvete modrými nebo růžovými květy. Plodem je tobolka několikamilimetrové velikosti.

Ceanothus leucodermis

synonyma: C. divaricatus, C. divaricatus var. eglandulosus, C. divaricatus var. grosseserratus, C. divaricatus var. laetiflorus, C. eglandulosus

oblasti: Kalifornie

Pochází z Kalifornie. Dorůstá výšky 4m. Borka je šedobílá a větve mají trny. Stálezelené listy vyrůstají střídavě, mají oválný tvar a délku 4cm. Kvete levandulově bílými modrými květy. Plodem je třílaločná tobolka o délce 0,5cm.

Ceanothus maritimus

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Borka má šedočervenou barvu, starší pouze šedá. Stálezelené listy vyrůstají vstřícně, mají oválný tvar do délky 2cm s jasnou vrchní zelenou barvou a matnou na spodní straně. Kvete tmavěmodrými květy. Plodem je 6mm tobolka.

Ceanothus martini

synonyma: C. utahensis

Ceanothus martinii

oblasti: Arizona, Kolorado, Nevada, Utah, Wyoming

Ceanothus masonii

oblasti: Kalifornie, Minnesota

Patří mezi endemity Kalifornie. Dorůstá výšky až 2m. Stálezelené listy vyrůstají vstřícně a jsou dlouhé do 2cm. Mají oválný tvar a ostré zoubkování na kraji. Kvete tmavěmodrými květy.

Ceanothus megacarpus

synonyma: C. cuneatus var. macrocarpus, C. macrocarpus, C. megacarpus, C. megacarpus var. pendulus

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Dokáže přerůst výšku 3m. Tvar stálezelených listů je oválný a kvete drobnými bílými květy. Plodem je červenozelená tobolka o šířce 1cm se 3mi semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. insularis
- var. megacarpus

Ceanothus microphyllus

synonyma: C. glaber, C. hypericoides

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Ceanothus ochraceus

synonyma: C. azureus var. parvifolius

Ceanothus oliganthus

synonyma: C. divaricatus, C. hirsutus, C. hirsutus var. orcuttii, C. oliganthus var. hirsutus, C. oliganthus var. orcuttii, C. orcuttii

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou stálezelené, vyrůstají střídavě a dorůstají délky 4cm. Mají tmavězelenou barvu se zubatým okrajem. Kvete v modrých nebo růžových květech. Plodem je tobolka. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. soledatus

Ceanothus ophiochilus

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Dorůstá výšky 2m, ale obvykle je nižší. Mladé větve jsou červené,

stářím přecházejí do šedé. Listy vyrůstají vstřícně a dosahují délky pouze 1cm. Kvete bílými nebo narůžovělými květy.

Množí se pouze semeny.

Ceanothus pallidus

Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Marie Simon'

Ceanothus palmeri

synonyma: *C. spinosus* var. *palmeri*

oblasti: Kalifornie

Ceanothus papillosus

synonyma: *C. dentatus* var. *papillosus*, *C. papillosus* subsp. *roweanus*, *C. papillosus* var. *regius*, *C. papillosus* var. *roweanus*, *C. regius*, *C. roweanus*, *C. x regius*

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě stálezeleného keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 3,5m. Listy jsou střídavé, kožovité, kopinaté a dlouhé 3,5cm. Květenstvím je hrozen a vlastní květy jsou sytě tmavěmodré. Plodem je 3mm tobolek. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *papillosus*
- var. *roweanus* - rozložitější habitus; výška do 1,8m; listy užší

Ceanothus parryi

synonyma: *C. integerrimus* var. *parryi*

oblasti: Kalifornie

Pochází z Oregonu a severní Kalifornie. Dorůstá výšky 5m. Borka je červenohnědá. Stálezelené listy vyrůstají střídavě, mají oválný tvar. Horní strana je tmavězelená, spodní bledší. Kvete modrými květy. Plodem je třílaločná tobolek velká několik mm.

Ceanothus parvifolius

synonyma: *C. integerrimus* var. *parvifolius*, *C. parvifolius*

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Výškou obvykle nepřesahuje 1m. Dřevnaté části jsou načervenalé. Opadavé listy vyrůstají střídavě a mají délku menší než 2cm. Tvarem jsou oválné, občas s drobnými

zoubky na okraji. Kvete tmavěmodrými květy. Plodem je 3laločná tobolka velká několik mm.

Ceanothus pinetorum

synonyma: C. prostratus var. pinetorum

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Dorůstá výšky do 1m, ale šířky až 8m. Listy jsou stálezelené, vyrůstají vstřícně a délku mají do 2cm. Kvete tmavěmodrými až bělavými květy.

Ceanothus prostratus

synonyma: C. divergens subsp. occidentalis, C. prostratus f. albiflorus, C. prostratus var. divergens, C. prostratus var. laxus, C. prostratus var. occidentalis, C. prostratus var. profugus

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 10cm, ale šířky až 2,5 - 3m. Větve jsou plazivé a dokáží znovu zakořenit. Listy jsou vstřícné, oválné, tmavězelené, ostře pilovité a spodní bledší. Kvete tmavěmodrými nebo bílými květy. Plodem je červená tobolka o velikosti 0,5 - 1cm.

Vyhovují mu vysoké nadmořské výšky.

Ceanothus pumilus

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází z jižního Oregonu a severní Kalifornie. Roste především do šířky a to až do 2,5m. Tenké stálezelené listy vyrůstají vstřícně a mají délku kolem 1cm. Kvete v odstínech modré. Plodem je hrbolatá tobolka velká 0,5cm.

Ceanothus purpureus

synonyma: C. jepsonii var. purpureus

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity severní Kalifornie. Dorůstá výšky do 2m. Dřevnaté části jsou šedé až červenohnědé. Stálezelené listy vyrůstají vstřícně a mají délku do 2,5cm. Mají oválný kulatý tvar se zvlněným zoubkatým okrajem. Kvete modrými nebo růžovými květy. Plodem je hrbolatá 0,5cm tobolka.

Ceanothus repens

Ceanothus roderickii

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Dorůstá šířky 3m. Borka má šedohnědou barvu. Tenké stálezelené

listy vyrůstají vstřícně, mají délku 1cm, občas laločnaté nebo se zubatým okrajem. Kvete bílými nebo namodralými květy. Plodem je tobolka velká 0,5 - 1cm.

Ceanothus sanguineus

synonyma: C. oreganus

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Michigan, Montana, Oregon, Washington

Pochází ze západu Severní Ameriky. Dorůstá výšky 3m. Větve mají červenou barvu, dřevnaté části jsou zelené. Opadavé listy vyrůstají střídavě a dosahují délky 10cm. Jsou tenké, světle zelené, oválné, se zubatým okrajem. Kvete bílými květy. Plodem je třílaločná tobolka velká 4mm.

Ceanothus serpyllifolius

synonyma: C. microphyllus var. serpyllifolius

oblasti: Florida, Georgia

Ceanothus sonomensis

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Dorůstá výšky 1m. Stálezelené listy vyrůstají vstřícně, mají oválný tvar se zubatým okrajem. Jsou svěže zelené, bledší ze spodní strany. Kvete drobnými modrými květy. Plodem je 0,5cm tobolka.

Ceanothus sorediatus

oblasti: Kalifornie

Ceanothus spinosus

oblasti: Kalifornie

Pochází z jižní Kalifornie. Patří mezi nízké stromy, ale vzhledem se podobá keři. Dorůstá výšky 6m. Stálezelené listy mají 4 - 5cm délku. Plodem je 0,5cm tobolka obsahující 3 semena.

Ceanothus thyrsiflorus

synonyma: C. elegans, C. thyrsiflorus var. chandleri, C. thyrsiflorus var. repens, Forrestia thyrsoidea

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky až 6m. Listy jsou stálezelené. Barva květu se pohybuje mezi bílou a modrou. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Mound' - výška 1,5m, šířka i více než 1,8m
- 'Cascade' - větve široce obloukovité; výška 8m; květy bleděmodré
- var. repens - kompaktní habitus; výška 1 - 3m; listy zelené s 3mi nápadnými žilkami; válcovitá lata,

květy bleděmodré až prakticky bílé

Vyhovují mu vlhké pobřežní lesy.

Ceanothus tomentosus

synonyma: C. azureus, C. oliganthus var. tomentosus, C. tomentosus subsp. olivaceus, C. tomentosus var. olivaceus

oblasti: Kalifornie

Pochází z Kalifornie. Dorůstá výšky 3m. Dřevnaté části jsou načervenalé. Stálezelené listy vyrůstají střídavě, mají oválný tvar, tmavě zelenou barvubledší na spodní straně. Okraje jsou jemně zubaté. Barva květů je bílá nebo modrá. Plodem je laločnatá tobolka několik mm velká.

Ceanothus velutinus

synonyma: C. grandis

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Pochází ze západu Severní Ameriky. Dorůstá výšky 4m, ale obvykle zůstává pod 3m. Listy jsou stálezelené, aromatické, dlouhé až 8cm. Mají oválný tvar. Plod je trojlaločný, několik mm dlouhý a obsahuje 3 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. hookeri
- var. velutinus

Ceanothus verrucosus

oblasti: Kalifornie

Pochází z Kalifornie. Dorůstá výšky 3m. Stálezelené listy vyrůstají střídavě a jsou dlouhé 1,5cm. Plodem je 0,5cm tobolka.

Ceanothus x arcuatus

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x bakeri

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x delileanus

Ceanothus x delilianus (Latnatec křížený)

Kříženec *C. americanus* a *C. coeruleus*. Kvete modrými květy v latě. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Gloire de Versailles' - výška 3,5m; laty vzpřímené, květy bleděmodré

Ceanothus x flexilis

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x lobbianus

synonyma: *C. dentatus* subsp. *lobbianus*, *C. dentatus* var. *lobbianus*

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x lorenzenii

synonyma: *C. velutinus* var. *lorenzenii*, *C. x glaber*

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x mendocinensis

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x otayensis

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x pallidus (Zpododěr bledý)

Ceanothus x rugosus

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x serrulatus

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x vanrensselaeri

oblasti: Kalifornie

Ceanothus x veitchianus

oblasti: Kalifornie

Kříženec *C. griseus* a *C. rigidus*. Roste v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou malé, vejčité, zubaté a žilnatina je hluboce zapuštěná. Květenstvím je lata a vlastní květy jsou modrofialové.

Další informace:

<http://www.about-garden.com/a/en/3895-ceanothus-x-blue-sapphire-blueblossom/>

<http://www.garten.cz/a/cz/1973-ceanothus-x-blue-sapphire-zpododer-latnatec/>

<https://www.rostliny.net/>