

Bulbine

čeleď: Xanthorrhoeaceae

Rodové jméno je odvozeno od řeckého slova bulbos = cibule. Je to matoucí, protože pod zemí nevytváří cibuli, ale zdužnatělý kořen. Rostou především v jižní Africe s přesahem do tropické Afriky a několik druhů roste i v Austrálii zpravidla v podobě trvalky nebo polokeře, pouze 2 druhy jsou jednoletkami. Květenstvím je terminální hrozen tvořený ze žlutých krátce stopkatých hvězdičkovitých květů s 6ti korunními lístky. Plodem je tobolka.

Vyžaduje dobře propustnou hrubší půdu s bohatou závlahou v době vegetace, ale zimní období potřebuje suché. Nedokáží u nás přezimovat.

Množí se semeny nebo řízkami.

Bulbine abyssinica

synonyma: *B. asphodeloides* var. *filifolioides*, *B. asphodeloides* var. *monticola*, *B. asphodeloides* var. *xanthobotrys*, *B. decurvata*, *B. hamata*, *B. huilensis*, *B. latitepala*, *B. xanthobotrys*

Bulbine alata

synonyma: *B. semibarbata* var. *depilata*, *Bulbinopsis semibarbata* var. *depilata*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie, Západní Austrálie

Bulbine alooides

synonyma: *Anthericum aloifolium*, *Anthericum alooides*, *B. acaulis*, *B. macrophylla*, *Phalangium alooides*

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě stálezelené trvalky. Kmínek vytváří až od 3 let, ale je pouze zakrnělý. Listy vytvářejí růžici o průměru až 22cm, jsou žlutozelené, dužnaté, 3úhlé a špičaté. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou žluté, 6tičetné a průměru 1,5cm. Občas vytváří odnože.

Vyhovuje jí písčité půda chudá na živiny.

Množí se semeny nebo odnožemi.

Bulbine alveolata

Bulbine angustifolia

synonyma: *B. tortifolia*

Bulbine annua

synonyma: *Anthericum annuum*, *Phalangium annuum*

Bulbine asphodeloides

synonyma: *Anthericum altissimum*, *Anthericum asphodeloides*, *Anthericum longiscapum*, *Anthericum succulentum*, *B. altissima*, *B. crocea*, *B. dielsii*, *B. longiscapa*, *B. mettinghii*, *B. pallida*, *Phalangium altissimum*, *Phalangium asphodelodes*, *Phalangium longiscapum*

Bulbine bachmannii

synonyma: *Anthericum nutans*, *B. bachmanniana*, *B. nutans*, *Phalangium nutans*

Bulbine bruynsii

Bulbine bulbosa

synonyma: *Anthericum bulbosum*, *Anthericum semibarbatum*, *Blephanthera depressa*, *Blephanthera hookeri*, *B. australis*, *B. fraseri*, *B. subbarbata*, *Bulbinopsis bulbosa*, *Phalangium bulbosum*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii jako trvalka v trsech v hustých koloniích. Dorůstá výšky až 75cm. Pod zemí vytváří hlízovité oddenky. Listy jsou tlusté, šedozelené a úzce kopinaté. Květenstvím je řídký postupně nakvétající hrozen, vlastní květy jsou 6tičetné a vydrží pouze 1 den. Plodem je 3dílná tobolka obsahující zpravidla pár hnědočerných semen na každé pouzdro.

Vyskytuje se v suchých lesích, ale i na sezónně zaplavovaných místech. Zimuje při 10°C.

Množí se dělením trsů nebo semeny.

Bulbine capensis

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Bulbine capitata

synonyma: *B. asphodeloides* var. *otaviensis*, *B. lydenburgensis*, *B. stenophylla*

oblasti: Botswana, Jihoafrická Republika (JAR), Namibie, Svazijsko, Zimbabwe

Roste v jihovýchodní Africe v trsech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 45cm. Pod zemí vytváří dřevitý válcovitý oddenek. Listy jsou čárkovité, seskupené při bázi stonku. Mají délku 10 - 25cm, šířku 2mm a jsou ztlustlé. Lodyha je zakončená hroznovitým květem, je vystoupavá až přímá, dlouhá do 25cm. Listeny květů jsou vejčité až úzce kopinaté, vlastní květy stopkaté, mají průměr 1cm. Okvětní lístky jsou eliptické, žluté, dlouhé do 6mm, široké 2,5 - 3,5mm. Plodem je vejčitá mělce 3laločná tobolka délky do 7mm.

Vyhovují jí otevřené traviny nebo křoviny, písčité nebo skalnatá půda, svahy, atp.

Bulbine cepacea

synonyma: *Anthericum pugioniforme*, *B. bisulcata*, *B. cataphyllata*, *B. inexpectata*, *B. parviflora*, *B.*

pugioniformis, B. tuberosa, Ornithogalum cepaceum, Ornithogalum tuberosum, Phalangium bisulcatum, Phalangium pugioniforme

Bulbine coetzeei

Bulbine crassa

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste na ostrovech mezi Viktorií a Tasmánií.

Bulbine cremnophila

Bulbine crocea

Bulbine dactylopsoides

Bulbine diphylla

oblasti: Západní Kapsko

Roste v Západním Kapsku. Pod zemí vytváří 1cm nahnědlý kaudex s 3 - 7mi laloky. Délka stonku nepřesahuje 2cm. Kvete sytě žlutými květy.

Množí se semeny.

Bulbine disimilis

Bulbine erectipilosa

synonyma: B. canaliculata

Bulbine erumpens

Bulbine esterhuyseniae

Bulbine fallax

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Pod zemí vytváří řepovitý kořen délky 3 - 5cm. Listy vytvářejí přízemní růžici o průměru 6 - 15cm, jsou síťované bledě zelené, průhledné, později zelené

až hnědočervené a dlouhé do 9cm. Kvete žlutými květy. Plodem je tobolka obsahující semena o průměru 3mm.

Vyhovuje ji dobře propustná půda s vyšším obsahem železa a plné slunce.

Množí se semeny.

Bulbine favosa

synonyma: *Anthericum favosum*, *B. dubia*, *B. filifolia*, *B. majori*, *B. rigidula*, *B. setifera*, *B. trichophylla*, *Phalangium favosum*, *Phalangium filifolium*

Bulbine flexicaulis

synonyma: *B. inops*

Bulbine flexuosa

Bulbine foleyi

Bulbine fragilis

Bulbine francescae

oblasti: Namibie

Patří mezi endemity Namíbie.

Bulbine frutescens

synonyma: *Anthericum frutescens*, *Anthericum fruticosum*, *Anthericum incurvum*, *Anthericum multiceps*, *Anthericum rostratum*, *B. caulescens*, *B. frutescens* var. *incurva*, *B. frutescens* var. *rostrata*, *B. incurva*, *B. rostrata*, *Phalangium frutescens*, *Phalangium rostratum*

oblasti: Kapsko, Limpopo, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku jako trvalka. Dorůstá výšky 30 - 45 (i 60)cm a ještě větší šířky. Stonek je od báze větvený, vystoupavý nebo přímý, může jich být více, jsou šedozelené až světlezelené a zakončené hroznovitým květenstvím. Listy jsou vstříčné, seskupené na bázi, ztlustlé, duté, čárkovité, světlezelené až šedozelené, vzpřímené, na slunci voskovité a dlouhé 4 - 15 (i 22)cm. Květenství je vzpřímené až vystoupavé, hroznovité, dlouhé do 45cm, vlastní květy jsou malé, žluté až oranžové, 6tičetné, vodorovné až mírně převislé s oranžovým proužkem na korunních lístcích. Plodem je malá kulatá 3pouzdrá tobolka obsahující vejčitá černá semena. Má léčivé účinky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Hallmark' - květy ploché a žluté

Vyhovují ji křoviny. Zálivka se provádí až po proschnutí substrátu. Ten by měl mít hlinitopísčité složení s dobrou drenáží. Zimuje v rozmezí 5 - 8°C při omezené zálivce (odolává teplotám až do

-5°C).

Množí se řízký.

Bulbine glauca (Jagavka sivá)

synonyma: *B. hookeri*, *B. suavis*, *Bulbinopsis terrae-victoriae*, *Nemopogon glaucum*

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii.

Bulbine haworthioides

Z cibule vyrůstají krátké sukulentní zelené listy v růžici, která skutečně připomíná rod *Haworthia*. Kvete žlutými květy na vysokém tenkém stonku v řídkém hroznu.

Má ráda nižší teploty, nejlépe 10 - 15°C.

Bulbine inamarxiae

Bulbine inflata

Bulbine lagopus

synonyma: *Anthericum lagopus*, *B. caespitosa*, *B. graminea*

Bulbine lamprophylla

Bulbine latifolia

synonyma: *Anthericum latifolium*, *B. brunsvigiaefolia*, *B. brunsvigiifolia*, *B. ensifolia*, *B. natalensis*, *B. transvaalensis*, *Phalangium latifolium*

oblasti: KwaZulu-Natal, Východní Kapsko

Roste v JAR s přesahem do tropické Afriky. Vytváří přízemní listovou růžici z 3úhelníkových špičatých listů. Délka listů je 19 - 40cm a šířka 3 - 6cm. Kvete na až 1m dlouhé (u starých exemplářů až 4cm široké) lodyze žlutými hvězdičkovitými květy v hustém hroznu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *latifolia*/*B. natalensis* - východní kapsko, KwaZulu-Natal; dužnaté žluté kořeny; stálezelené listy délky 8,5 - 13cm a šířka 3,5 - 4,4cm; květní stvol délky 50cm; snáší údajně teploty až -4°C

Bulbine lavrani

Bulbine lolita

Bulbine longifolia

Bulbine louwii

Bulbine margarethae

Bulbine meiringii

Bulbine melanovaginata

Bulbine mesembryanthemoides

synonyma: *Anthericum mesembryanthemoides*, *B. orchioides*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR. Pod zemí vytváří menší hlízovitý kaudex. Listy vytvářejí přízemní 3 - 7mičetný vzpřímenou až vystoupavou růžici, listy jsou špičaté, na řezu kulaté, světle zelené, na špičce s drobnými okénky, které k bázi přecházejí do linek, dlouhé do 3cm a průměru 2,5cm. Květenstvím je řídký hrozen na dlouhé stopce, vlastní květy jsou drobné a žluté. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *namaquensis* - pouze 1 zakrnělý list

Vyhovuje jí plné slunce a dobře propustná půda. Snáší teploty do 5°C.

Množí se semeny.

Bulbine minima

synonyma: *B. concinna*, *Phalangium minimum*

Bulbine monophylla

Bulbine muscicola

Bulbine namaensis

synonyma: *B. vesicularis*

oblasti: Namibie

Patří mezi endemity Namíbie.

Bulbine narcissifolia

synonyma: *B. densiflora*, *B. latibracteata*, *Phalangium densiflorum*, *Phalangium narcissifolium*

Bulbine navicularifolia

Bulbine nutans

Bulbine ophiophylla

Bulbine pendens

Bulbine pendula

oblasti: Západní Austrálie

Bulbine praemorsa

synonyma: *Anthericum praemorsum*, *B. laxiflora*, *B. nutans*, *B. tetraphylla*, *B. urGINEOIDES*, *B. zeyheri*, *Phalangium laxiflorum*, *Phalangium praemorsum*, *Phalangium urGINEOIDES*, *Phalangium zeyheri*

Bulbine quartzicola

Bulbine ramosa

Bulbine retinens

Bulbine rhopalophylla

Bulbine rupicola

Bulbine sedifolia

Bulbine semenaliundata

synonyma: *B. undulata*

Bulbine semibarbata

synonyma: *Amaryllis semibarbata*, *Anthericum semibarbatum*, *B. floribunda*, *B. semibarbata* f. *gracilescens*, *Bulbinopsis semibarbata*, *Phalangium semibarbatum*, *Triglochin racemosa*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Pochází z Austrálie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 7 - 45cm. Kvete v terminálním hrozu ze žlutých 6tičetných hvězdičkovitých květů.

Vyhovuje jí písčité půda a vlhko v zimě.

Bulbine stolonifera

Bulbine striata

Bulbine succulenta

synonyma: *B. hantamensis*

Bulbine suurbergensis

Bulbine thomasiae

Bulbine torsiva

Bulbine torta

synonyma: *B. circinata*, *B. mallyana*

Bulbine triebneri

synonyma: *B. alba*, *B. triebneri*

Bulbine truncata

Bulbine vagans

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Bulbine vitrea

Bulbine vittatifolia

Bulbine wiesei

Další informace:

<http://botany.cz/cs/bulbine-capitata/>

<http://www.zelenelisty.cz/clanky/werbar---cibuloviny/bulbine-natalensis.html>

<https://www.rostliny.net/>