

Gentianopsis ciliata (Hořec brvitý)

synonyma: Anthopogon ciliata, Crossopetalum ciliatum, Crossopetalum gentiana, Crossopetalum gentianoides, Gentiana ciliata, Gentiana fimbriata, Gentianella ciliata, Gentianella ciliata f. albiflora, Gentianella fimbriata, Gentianusa ciliata

čeleď: Gentianaceae

oblasti: Apeniny, Balkánský poloostrov, Česká republika, Kavkaz, Německo, Polsko, Pyreneje, Rakousko, Slovensko, Ukrajina, V Alpy

Vyskytuje se od jižní a střední Evropy po Pyreneje. Může růst jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Stonek je tenký, 4hranný s podélnými lištami. Vytváří pouze lodyžní listy, jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 1,8 - 3,5cm, široké 1,8 - 3,8mm a báze je přisedlá. Kvete modrými (vzácně bílými) 4četnými květy o délce 5 - 6cm s až 2,5cm kalichem, cípy koruny jsou dlouze brvitě a koruna je dlouhá 3,5 - 4,5cm. Semeník je dlouze stopkatý. Plodem je tobolka. Patří mezi ohrožené druhy C3.

Vyhovují ji suší trávníky, lesní světliny, stráně, lomy atp. s bazickou půdou bohatou na vápník.

<https://www.rostliny.net/>