

Callicarpa (Krásnoplodka)

čeleď: Verbenaceae

Roste na východě a jihovýchodě Asie, Austrálie, jihovýchodě Severní a střední Americe v podobě opadavého až stálezeleného zpravidla dvoudomého keře (i stromu). Větve jsou mírně prutovité. Listy jsou jednoduché, vstřícné, vejčité, zubaté, dlouhé 5 - 25cm a na spodní straně zpravidla ochlupené. Květenstvím je úžlabní okolík, vlastní květy jsou bílé, růžové nebo fialové. Plodem je 2 - 5mm bobule barvy růžové, fialové nebo červené. Mnoho druhů se využívá v medicíně nebo pro výrobu čajů.

Potřebuje chráněné místo a půdu bohatou na živiny. Na zimu je nutné rostlinu zakrýt např. chvojím.

Množí se vrcholovými řízkami.

Callicarpa acuminata

Kvete bílými květy. Plodem je tmavá červená nebo modrá bobule.

Callicarpa americana (Krásnoplodka americká)

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v USA v podobě rozložitého keře. Dorůstá výšky i šířky 1 - 1,5 (i 1,8)m. Listy jsou široké, nápadně žilkované a spodní strana je plstnatá. Květenstvím je úžlabní okolík složený z růžových až fialových květů. Plodem je husté plodenství tvořené kulatými fialovými až růžovofialovými peckovičkami. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Lactea'

Callicarpa ampla

oblasti: Portoriko

Callicarpa bodinieri (Krásnoplodka Bodinerova)

oblasti: Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Sichuan, Vietnam, Yunnan, Z Čína

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky i šířky 1,8 - 3m. Větve jsou v mládí jemně šupinkaté, řapíky a květenství je hustě hvězdicovitě ochlupené. Listy jsou opadavé, eliptické až vejčité či kopinaté, špičaté, tmavězelené, červeně žláznaté, ochlupené, dlouhé 5 - 18cm, spodní strana téměř holá nebo hvězdicovitě plstnatá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Kvete růžovofialovými květy na nových výhonech (proto se na jaře doporučuje seřezávání) v okolíku o průměru 2 - 4,5cm na až 1cm, vlastní květy mají 1mm stopku, kalich je hvězdicovitě plstnatý, dlouhý 1mm, ušty tupě 3úhlé, koruna růžovofialová nebo růžová, velikosti 3mm, hvězdicovitě plstnatá, tyčinek 6, semeníky ochlupené. Plodem je fialová až růžovofialová kulovitá peckovice šířky 2 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bodinieri*/C. *feddei*/C. *seguinii*/C. *tsianii* - Anhui, Guangdon, Guanxi, Guizhou, jižní Henan, Hubei, Sichuan, Yunnan a Vietnam; listy úzce eliptické, eliptické nebo vejčité eliptické, dlouhé 7 - 18cm, široké 4 - 7cm, papírovité, malé červené až tmavěčervené žlásky, spodní strana hvězdovitě plstnatá, báze klínovitá, okraj jemně pilovitý, konec zašpičatělý; kalich na vnější straně tmavěčerveně žláznatý, koruna tmavěčerveně žláznatá

- var. *giraldii* - listy méně plstnaté

- 'Profusion' - bohaté plodenství

- var. *iteophylla* - jižní Yunnan; listy kopinaté až obkopinaté, dlouhé 6 - 13cm, široké 2 - 4cm, báze úzce klínovitá, obě strany olýsávají, tmavěčerveně žláznaté; kalich a koruna téměř holé, tmavěčerveně žláznaté

- var. *rosthornii*/C. *giraldii* var. *rosthornii*/C. *lonifolia* var. *rosthornii* - Sichuan; listy obkopinaté až obvejčité podlouhlé, hustě žláznaté, na spodní straně našedle hvězdovitě ochlupené, báze úzce klínovitá, okraj nad středem pilovitý

Potřebuje slunné místo nebo polostín, dobře propustná neutrální půda, ideálně mírně vlhká, bohatá na živiny. Odolává teplotám do -24°C. Starší rostliny dobře snášejí i delší dobu sucha či horka a horší půdy. Dobře snáší řez.

Callicarpa cana

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodu Asie.

Callicarpa candicans

Callicarpa cathayana

oblasti: Čína

Pochází z Číny. Plodem je červená bobule.

Callicarpa dichotoma (Krásnoplodka vidličnatá)

oblasti: Čína, Japonsko, Jižní Karolína, Severní Karolína, Tennessee, Virginie

Roste v Číně a Japonsku v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky i šířky 1,2 - 1,5 (i 2)m. Listy jsou mírně lesklé a nápadně žilkované. Květenstvím je okolík, vlastní květy jsou růžovofialové, růžové (i bílými) 4četnými květy, cípy jsou zakulacené. Plodem je červená až světlefialová peckovice. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Issai'

Callicarpa erioclona

Kvete bílými nebo světlorůžovými květy.

Callicarpa formosana

oblasti: Japonsko, Tchaj-wan

Pochází z území od Tchaj-wanu po jižní Japonsko. Kvete bílými květy. Plodem je světlečervená bobule.

Callicarpa giraldii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. giraldii

- 'Profusion'

Callicarpa japonica (Krásnoplodka japonská)

oblasti: Čína, Japonsko, Severní Karolína

Roste v Číně a Japonsku v podobě keře. Dorůstá výšky i šířky 0,5 - 1 (i 1,8)m. Listy jsou opadavé, úzké, jemně zubaté a dlouze špičaté. Květenstvím je malý okolík, vlastní květy jsou růžové až bílé. Plody jsou růžové. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. albibacca

- var. angustata - dlouhé úzké listy

- 'Heavy Berry'

- 'Leucocarpa' - plody bílé

Callicarpa kochiana

Callicarpa kwangtungensis

oblasti: Čína

Pochází z Číny. Kvete bílými nebo růžovými květy. Plodem je světlorůžová bobule.

Callicarpa lamii

Callicarpa lanata

oblasti: Indie, Střední Asie

Pochází z Indie. Plodem je bobule.

Callicarpa longifolia

oblasti: Austrálie, Himálaj, Japonsko, JV Asie

Pochází z Himálaje, Japonska až Austrálie.

Callicarpa longissima

Callicarpa macrophylla

oblasti: Bangladéš, Indie, Pákistán

Roste v podhůří Himálaje v Pákistánu, Indii a Bangladéši v podobě vzpřímeného stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 6m a šířky až 9m při průměru kmene až 15cm. Větve jsou v mládí hustě ochlupené. Listy jsou vstřícné, vejčitěkopinaté až úzce kopinaté, špičaté, tmavězelené, dlouhé 10 - 25 (i 30)cm, široké (2,5 -) 5 - 7,5cm, na spodní straně ochlupené a řapíky jsou dlouhé (0,6 -) 1 - 1,5 (i 2)cm. Květenstvím je okolík délky do 5cm včetně 2,5cm stopky, vlastní květy jsou růžové, světlefialové až načervenalé, průměru 4mm, kalich je zvonkovitý, 4zubý, hustě ochlupený, dlouhý 1,7mm, koruna je dlouhá 2,5mm s trubkou stejné délky jako kalich. Plody jsou kulovité, bělavé, průměru 2 - 3mm a obsahují zpravidla 1 semeno, které je jedovaté.

Callicarpa maingayi

oblasti: Malajsie

Pochází z Malajsie a Singapuru.

Callicarpa mollis

oblasti: Japonsko, JV Asie, Korea

Pochází z míst od jihovýchodní Asie po Koreu a jižní Japonsko.

Callicarpa nudiflora

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie.

Callicarpa pedunculata

Roste v podobě malého stromu nebo keře. Listy má zelené až hnědé. Plodem je tmavěčervená bobule. Pro lidi je jedovatá.

Callicarpa pentandra

oblasti: Borneo, Indie, J Čína, Melanésie, Střední Asie

Pochází z Indie, jižní Číny, Šalamounových ostrovů a Bornea. Listy mají ovální tvar. Kvete fialovými květy. Plodem je růžová bobule.

Callicarpa reevesii

Listy jsou drobné, oválné. Kvete bílými nebo světlemodrými květy.

Callicarpa rubella

Plodem je tmavěčervená bobule.

Callicarpa shikokiana

oblasti: Čína

Pochází z Číny. Listy se na podzim barví do žluta. Kvete růžovými květy. Plodem je bobule.

Callicarpa tomentosa

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=166>

<http://www.garten.cz/e/cz/158-callicarpa-bodinieri-krasnoplodka-bodinerova/>

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/4515-callicarpa-bodinieri-var.giraldii-profusion-krasnoplodka/>

<https://www.rostliny.net/>