

Cotinus (Ruj)

čeleď: Anacardiaceae

Roste v mírném pásu Eurasie a Severní Ameriky podobě keře nebo malého stromu. Listy jsou opadavé, střídavé, vejčité až obvejčité a dlouhé 3 - 13cm. Květenstvím je bohatě větvená dlouze stopkatá lata na 2letém dřevě s délkou 15 - 30cm, vlastní květy jsou nenápadné a drobné. Zajímavý je zejména po odkvětu, kdy se na místě květů vytváří jemné barevné chomáčky.

Potřebuje chráněné místo, plné slunce, teplé a sušší léta. Na půdu nemá speciální nároky.

Množí se nedřevnatými řízkami nebo semeny.

Cotinus carranzae

Cotinus chiangii

synonyma: *Rhus chiangii*

Cotinus coggygria (Ruj vlasatá)

synonyma: *C. arenarius*, *C. cinereus*, *C. coggygria* f. *atropurpureus*, *C. coggygria* f. *pendulus*, *C. coggygria* subsp. *glabrus*, *C. coggygria* var. *chengkouensis*, *C. coggygria* var. *cinereus*, *C. coggygria* var. *laevis*, *C. coggygria* var. *pendulus*, *C. coggygria* var. *pubescens*, *C. coggygria* var. *velutinus*, *C. coriarius*, *C. cotinus*, *C. ellipticus*, *C. velutinus*, *Rhus cotinus*, *Rhus laevis*, *Rhus velutina*

oblasti: Arménie, Balkánský poloostrov, Connecticut, Gansu, Guizhou, Hebei, Henan, Himálaj, Hubei, Illinois, Írán, Itálie, Jiangsu, JV Francie, Kavkaz, Krym, Malá Asie (Anatolie), Maryland, Massachusetts, Německo, Nepál, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Rhode Island, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Slovensko, SZ Indie, Švýcarsko, Ukrajina, Utah, Vermont, Yunnan, Z Středozeří, Zhejiang

Roste od jižní Evropy po Čínu v podobě hustého keře až stromu. Dorůstá výšky i šířky 2 - 3 (i 7)m v kulovém habitu. Větve jsou v mládí hnědofialové nebo načervenalé, jizvy po listech ledvinité, při zlomení aromatické a roní vodnaté mléko. Listy jsou střídavé, široce eliptické až obvejčité, zakulacené, sivozelené, na podzim oranžové až bronzové, dlouhé 4 - 8cm, široké 2 - 4cm, báze široce klínovitá, spodní strana je světlejší a řapíky jsou dlouhé 3 - 8cm. Květenstvím je vrcholová lata délky 15 - 30cm, vlastní květy jsou bílé až starorůžové, 5tičetné a průměru 0,5 - 1cm. Plodem je tmavěhnědá síťovinová zploštělá ledvinovitá peckovice délky (3 -) 4 - 5mm. se zelenou, později červenou stopkou. Celé plodenství je jemně červeně ochmýřené. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cinerea* - Čína
- 'Daydream' - kompaktní habitus; listy modrozelené; hnědorůžové dlouho vytrvávající plody
- 'Flame' - výška až 6m, šířka 5m; listy tmavězelené; květy růžové; plody tmavěružové
- var. *glaucophylla* - Čína
- 'Golden Spirit'/'Ancot' - výška do 2m; žluté listy, na podzim oranžové, růžové nebo červené
- 'Grace' - masová barva listů
- 'Kanari' - žlutozelené listy
- 'Notcutt's Variety' - červené listy, růžové květy

- 'Nordine' - červené listy i květenství
- var. pubescens - Čína
- 'Purpureus' - listy na jaře načervenalé
- 'Red Beauty' - výška 3 - 5m; listy růžovofialovočervené, později tmavěčervené
- 'Royal Purple' - pravidelnější habitus; výška 3m; listy zakulacenější, tmavě růžovofialové
- 'Rubrifolius' - výška 3 - 5m; listy červené, později nazelenalé, na podzim žlutočervené; květy načervenalé; plody červenorůžové
- 'Smokey Joe'/'Lisjo' - kompaktní habitus; výška 3m; listy zelené
- 'Velvet Cloak' - listy růžovofialové, na podzim tmavě červené
- 'Young Lady' - výška 1,5 - 2m; listy bledězelené; květy bohaté a časně; plody červenohnědé

Vyskytuje se přirozeně na skalnatých svazích a světlých lesích. Potřebuje plné světlo a teplo. Na půdu není náročná, ale lepší je dobře propustná, sušší, středně úrodná a vápenitá. Snáší i znečištěné ovzduší. V zimě mohou namrzat konce větví. Tyto části v předjaří stačí odstříhnout a v této době provádíme i celkový potřebný průklest. Nové větve se obvykle zkracují na 1/2 až 1/3.

Množí se dělením výhonů z kořenů.

Cotinus kanaka

synonyma: Rhus kanaka

Cotinus nanus

Cotinus obovatus (Ruj americká)

synonyma: C. americanus, C. cotinoides, C. retusus, Rhus cotinoides

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas

Roste v USA ve stromovitém dvoudomém keři. Dorůstá výšky 6 - 10 (i 12)m s průměrem kmene 25cm. Listy jsou v mládí růžovohnědé, později zelené, na podzim červenooranžové až červené a 6 - 13cm dlouhé. Květenstvím je řidší lata a vlastní květy jsou žlutozelené. Plody jsou šedorůžové a dlouhé 10 - 15cm.

Cotinus szechuanensis

oblasti: Čína

Pochází z Číny. Dorůstá výšky 2m. Listy mají délku 4cm a jsou dlouze řapíkaté.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/cotinus-coggygria/>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Cotinus>

<http://listnate-kere.atlasrostlin.cz/ruj-vlasata>

<http://www.dreviny-okrasne.cz/listnace/ruj/cotinus-coggygria>

<http://www.garten.cz/e/cz/257-ruj-vlasata-cotinus-coggygria-royal-purple/>

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/4001-cotinus-coggygria-royal-purple-ruj-vlasata/>

http://www.stredoceskestavby.cz/rostliny/cotinus_coggygria/

<https://www.rostliny.net/>