

## Nageia nagi

synonyma: *Agathis veitchii*, *Dammara veitchii*, *Decussocarpus nagi*, *Nageia caesia*, *Nageia cuspidata*, *Nageia grandifolia*, *Nageia japonica*, *Nageia ovata*, *Podocarpus caesius*, *Podocarpus cuspidatus*, *Podocarpus grandifolius*, *Podocarpus japonicus*, *Podocarpus nageia*, *Podocarpus nageia* var. *angustifolius*, *Podocarpus nageia* var. *rotundifolius*, *Podocarpus nagi*, *Podocarpus nagi* var. *angustifolius*, *Podocarpus nagi* var. *caesius*, *Podocarpus nagi* var. *ovatus*, *Podocarpus nagi* var. *rotundifolius*, *Podocarpus ovata*, *Podocarpus ovatus*

čeleď: Podocarpaceae

oblasti: Hainan, Japonsko, JV Čína, Tchaj-wan, Vietnam

Roste v Číně, Japonsku, Vietnamu a introdukcí na Tchaj-wanu v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky až 20 - 30m při tloušťce kmen 50 - 80cm. Borka je červenohnědá nebo tmavěšedá nebo hnědofialová, odlupuje se. Větve jsou vzpřímené, vystoupavé, rozkladité nebo převislé, našedlé až tmavěhnědé, vstřícné, holé, hustě olistěné s šedohnědými lenticelami. Listy jsou křížmostojné, řapíky na bázi silně zkroucené, horní strana je tmavězelená, lesklá, spodní bledězelená, vejčité kopinatá, kopinatá, elipticky kopinatá nebo úzce eliptická, kožovitá, dlouhá 2 - 9cm, široká 0,7 - 3cm, báze klínovitá nebo dlouze klínovitá, konec uťatý, široce tupý nebo špičatý. Samčí šištice jsou úžlabní, samostatné nebo ve skupinách až 10ti ks, válcovité, vejčité válcovité až téměř kulovité, velké 0,5 - 2,5cm. Samičí útvary jsou úžlabní, po 1 - 2ks s 0,4 - 1,3cm stopkami. Semena jsou kulovitá až hruškovitá s průměrem 1 - 1,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Variegata' - listy žlutě pruhované, kratší a okrouhlejší
- var. *nankoensis*/*N. nankoensis*/*Podocarpus nankoensis* - Hainan, Tchaj-wan; užší kopinatější přisedlé listy délky 6 - 9cm a šířka 1,3 - 2,5cm; samčí květenství po 4 - 5ti ks, délka 5 - 7mm; semeno kulovité velikosti 1 - 1,2cm s 1cm stopkou
- var. *rotundifolia* - listy více vejčité

<https://www.rostliny.net/>