

Nageia wallichiana

synonyma: Decussocarpus wallichianus, Nageia blumei, Nageia latifolia, Podocarpus agathifolius, Podocarpus blumei, Podocarpus latifolius, Podocarpus wallichianus

čeleď: Podocarpaceae

oblasti: Bangladéš, Filipíny, Indie, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar (Barma), Papua-Nová Guinea, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Yunnanu, Bangladéši, Kambodži, Indii, Indonésii, Laosu, Malajsii, Myanmaru, Papui Nové Guineji, Filipínách, Thajsku a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 50m při tloušťce kmene až 1m. Borka je hladká, tmavěhnědá nebo šedohnědá, odlupuje se ve velkých různě velkých částech. Listy jsou křížmostojné, dvouřadé, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm, horní strana je tmavězelená, spodní bledší nebo šedozelená, eliptická nebo kopinatě eliptická, dlouhá 6 - 14cm, široká 2 - 5cm u dospělých a u mladých délka 23cm a šířka 9cm. Povrch je kožovitý, báze klínovitá až protažená, konec špičatý. Samčí šištice jsou úžlabní, seskupené po 1 - 7ks, válcovité, dlouhé 0,8 - 1,8cm, široké 4 - 5mm. Samičí útvary jsou úžlabní, jednotlivé nebo vzácně v párech, mají 0,5 - 2cm stopky s kulovitá semena o průměru 1,5 - 1,8cm.

<https://www.rostliny.net/>